

## 6. 小菜蛾（吊絲蟲、青蟲）

### 危害生態：

幼蟲取食十字花科蔬菜，殘留葉脈及上表皮之蟲孔。亦聚集於幼嫩植株心葉取食，並吐絲致使植株抽芽受阻。幼蟲青綠色，頭為灰褐色，體之中段略較兩端粗大。幼蟲受驚擾時會立即吐絲下垂逃離，故又名「吊絲蟲」。成蛾翅膀背部有灰白色波浪狀斑紋，靜止時左右兩翅波紋相合成菱狀，白天活動，夜晚趨光，雌蟲約產卵量大(200粒以上)，卵散產於葉片葉脈上，老熟幼蟲於葉背作薄繭化蛹。

### 好發季節：

平地到高山地區都有分布，全年均可發生。平地秋末至春末為其發生盛期；夏季則發生於高冷地。一年可發生18~20代，高冷地區約10代。本蟲生活史短，世代數多，易產生抗藥性。輪用推薦藥劑，可獲較佳防治效果。



小菜蛾卵散產於葉脈上



小菜蛾老熟幼蟲



小菜蛾取食十字花科葉片



小菜蛾老熟幼蟲結薄繭化蛹



小菜蛾成蛾翅背有灰白色波浪狀斑紋



小菜蛾幼蟲受驚嚇吐絲下垂