

青江白菜 Chinese white cabbage

科名：十字花科

別名：青梗白菜、湯匙菜



生育環境條件：耐熱，土壤有機質砂壤土至黏質壤土爲佳，pH值以5.5~6.8爲適。

栽培方法：撒播，週年皆可栽培，播種後35~45天可採收。品種依其梗色分爲青梗及白梗二種，依其梗長分爲高腳及矮腳二種。商業品種有上海青梗白菜、華王二號青梗白菜、華王青江白菜、香港青江白菜、矮腳青江白菜、夏華京青梗白菜、長江青江白菜、平成青江白菜等。

京水菜 Water mustard

科名：十字花科

別名：京水菜



生育環境條件：生育適溫15~25℃，土壤以有機砂質壤土爲宜。

栽培方法：撒播，或穴盤育苗至4~5片時，移植至田間，行株距爲60×40公分，亦可種植在花盆中供觀賞。栽培品種爲鮮食及加工兩種。

塌棵菜 Broad-Beaked mustard

科名：十字花科

別名：鳥塌菜、塔棵菜



生育環境條件：生育適溫爲15~25℃，土壤pH值 5.5~6.7 之間，表土鬆軟肥沃爲宜。

栽培方法：穴盤育苗，幼苗本葉4~5片時，移植至田間，行株距30×25公分，栽培品種有大葉種及小葉種。

紅衣蘿蔔 Forcing radish

科名：十字花科

別名：小根蘿蔔



生育環境條件：性喜冷涼，種子發芽適溫為15~30℃，植株短小，根皮紅色、肉白色或紅心，根形圓錐狀，土壤pH5.8~6.8。

栽培方法：撒播栽培為主，株距4~5公分，或點播3~5粒，播種後20~25天，根橫徑2~3公分，為採收適期。

葉蘿蔔 Forcing radish

科名：十字花科

別名：菜花



生育環境條件：性喜冷涼，生長適溫20~25℃，土壤適應性廣，當作綠肥用。

栽培方法：撒播為主，當作綠肥，種子可以催芽，吃嫩苗，即為蘿蔔嬰。

白蘿蔔 Radish

科名：十字花科

別名：菜頭、萊菔



生育環境條件：性喜冷涼，種子發芽適溫為15~30℃，蘿蔔為深根性作物，土壤宜選擇通氣性，及排水良好的壤土或砂質壤土，土壤pH值5.8~6.8之間為適，蘿蔔忌連作，宜隔2~3年輪植一次，以避免病害發生。

栽培方法：點播栽培為主，每穴播3~4粒，發芽後陸續間拔成每穴留一株，蘿蔔種子有嫌光性，播種後要覆土。栽培品種包括

(1) 板葉種：杙仔群、大白杙、砵仔群、矸仔群。(2) 裂葉種：梅花群、梅花矸、梅花杙、美濃早生群、青皮群。其栽培行株距為畦寬1.2公尺（含畦溝）栽植2行，板葉種株距為20~25公分，梅花群25~30公分，美濃群30公分。