參、葉菜類蟲害防治藥劑一覽表

蔥科葉菜類

蔥科蔬菜：包括蒜、蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、洋蔥、珠蔥、蕗蕎等作物。

藥劑	濃度	稀釋倍數	作用機制 IRAC	毒性	安全採收期（天）	蔥科								蔥韭	青蔥				韭菜			蒜	珠蔥、蕗蕎
						切根蟲	夜蛾類	甜菜夜蛾	根蟎類	蚜蟲類	斑潛蠅類	葉部薊馬	薊馬類	薊馬類	夜蛾類	根蟎類	甜菜夜蛾	蔥潛蠅	韭根蟎	薊馬類	潛蠅	蒜根蟎	蚜蟲類
丁基加保扶可濕性粉劑	40%	1,200	1A	中	15									■									
乃力松乳劑	58%	1,000	1B	中	4					■				■									
加福松微粒劑	3%		1B	中	定植	■																	
可芬諾水懸劑	5%	1,000	18	低	18		■										■						
因得克水懸劑	14.5%	2,000	22A	中	9		■										■						
因滅汀水基乳劑/乳劑	2.15%	1,500	6	輕	6												■						
					9		■																
因滅汀水溶性粒劑	5%	5,000	6	輕	9		■										■						
佈飛松乳劑	43%	800	1B	中	10							■											
		1,000	1B	中	12														■				
					15				■							■							

克凡派水懸劑	10%	1,000	13	中	9					■									■			
免扶克乳劑	20%	500	1A	輕	12					■												
免扶克粒劑	5%		1A	輕	定植	■																
貝他賽扶寧乳劑	2.9%	1,500	3A	中	9							■							■			
					10									■								
芬化利粒劑	0.5%		3A	中	定植	■																
剋安勃水懸劑	18.4%	2,500	28	輕	小 9 根 14		■										■					
氟大滅水分散性粒劑	20%	3,000	28	輕	21(27)												■					
氟芬隆水分散性乳劑	9.6%	3,000	15	輕	12												■					
益滅松可濕性粉劑	50%	1,000	1B	中	7													■			■	
益達胺水懸劑	9.6%	2,000	4A	輕	6					■		■										
	18.2%	8,000	4A	輕	9					■												
益達胺溶液	9.6%	2,000	4A	輕	6					■		■										
	28.8%	12,000	4A	輕	9					■												
納乃得水溶性粒劑	40%	1,500	1A	中	10					■				■								
馬拉松乳劑	50%	1,500	1B	輕	4									■								
					7																	■
培丹水溶性粉劑	50%	1,000	14	中	10					■												
					15									■								

蔥科葉菜類

藥劑	濃度	稀釋倍數	作用機制 IRAC	毒性	安全採收期（天）	蔥科								蔥韭	青蔥				韭菜			蒜	珠蔥、蕗蕎
						切根蟲	夜蛾類	甜菜夜蛾	根蟎類	蚜蟲類	斑潛蠅類	葉部蔥馬	蔥馬類	蔥馬類	夜蛾類	根蟎類	甜菜夜蛾	蔥潛蠅	韭根蟎	蔥馬類	潛蠅	蒜根蟎	蚜蟲類
密滅汀乳劑	1%	1,500	6	中	6					■													
得芬諾水懸劑	19.7%	2,000	18	低	9		■										■						
甜菜夜蛾核多角體病毒水懸劑	2X10^{9}OBs/mL	3,000			免			■									■						
畢芬寧水懸劑	2.5%	1,000	3A	輕	14												■						
畢芬寧乳劑	2.8%	1,000	3A	中	14												■						
第滅寧水基乳劑 / 乳劑	28%	1,000	3A	中	6					■													
第滅寧水懸劑	24%	1,000	3A	低	6					■													
陶斯松粒劑	5%		1B	中	10	■																	
滅賜克可濕性粉劑	50%	800	1A	中	12							■											
		1,000			15									■									
祿芬隆乳劑	4.4%	1,500	15	輕	10		■										■						
福化利乳劑	25%	3,000	3A	輕	7							■											
福瑞松粒劑	10%		1B	劇	定植													■					
毆殺滅溶液	10%	450	1A	劇	26																■		

賜諾殺水懸劑	2.5%	1,000	5	輕	小 3 根菜 7							■										
賽洛寧水懸劑 / 乳劑	2.8%	2,000	3A	中	7						■											
賽速安勃水懸劑	150g/L	4,000	4A+28	中	9(15)										■							
	300g/L				9									■								
賽滅淨可濕性粉劑	75%	5,000	3A	輕	小 7(13) 根菜 14					■												
賽滅淨溶液	8.9%	800	3A	輕	7(13)											■						
					小 7(13) 根菜 14					■												
賽滅寧水基乳劑 / 乳劑	5%	750	3A	中	6							■										
賽滅寧可濕性粉劑	5%	750	3A	中	6							■										
	10%	1,500										■										
賽達松乳劑	50%	1,000	1B	中	12														■			
					15					■			■									
蘇力菌水分散性粒劑	48.1%	1,000	11	低	免										■							
護賽寧乳劑	31.6%	8,500	3A	中	15					■												

1. 安全採收期天數說明 ( ) : 設施安全採收期。小 : 小葉菜類。根菜 : 根菜類。定植 : 定植前施用。免 : 免訂安全採收期。
2. 資料來源為植物保護手冊，如有錯誤及最新蔥科作物病蟲害用藥，以主管機關公告為準。