貳、葉菜類病害防治藥劑一覽表

其它葉菜類

繖形花科小葉菜類：包括芹菜、茴香、水芹菜、山芹菜、芫荽等

藥劑	稀釋倍數(倍)	作用機制(FRAC)	毒性	安全採收期(天)	莧菜			菾菜		菠菜			葉用甘藷	蕹菜	繖形花科小葉菜類		豆科小葉菜類（葉用豌豆）				羅勒
					葉枯病	白絹病	白銹病	露菌病	白絹病	炭疽病	苗立枯病	露菌病	根腐病	白銹病	葉斑病	莖腐病	疫病	立枯病	苗腐病	露菌病	露菌病
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	11+40	輕	9								■								■	
23%亞托敏水懸劑	2000	11	輕	10			■	■				■		■	■					■	■
23.2%賓克隆水懸劑	1000	20	輕	15	■								■			■		■			
23.6%百克敏乳劑	3000	11	中	9						■											
33.5%快得寧水懸劑	1500	M1	低	15			■														
39.5%普拔克溶液	250	28	低	6																■	
50%達滅芬水懸劑	3000	40	輕	6																■	
50%達滅芬可濕性粉劑	3000	40	輕	6																■	
	4000			6(12)								■									

50%福多寧可濕性粉劑	2000	7	低	苗期用							■									
	3000			18		■			■											
60.8%氟比拔克水懸劑	1000	43+28	輕	6(12)															■	
	1500			6															■	
				6(12)								■								
64%甲鋅毆殺斯可濕性粉劑	400	M3+4	輕	15			■													
70%鋅錳賽得可濕性粉劑	600	M3+33	低	18								■								
71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	M1+4	輕	3								■							■	
75%滅普寧可濕性粉劑	1500	7	中	苗床用							■									
75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	M3+22	低	9(15)								■								
80%福賽得水分散性粒劑	500	33	輕	12			■							■						
500g/L 達滅芬水懸劑	3000	40	輕	6															■	
66.5%普拔克溶液	400	28	輕	6															■	
2.5%右滅達樂粒劑	20kg/公頃	4	低	定植前												■				
23.3%賓克隆水懸劑	1000	20	輕	15														■		

1.安全採收期天數說明： ( )→設施安全採收期。

2.資料來源為植物保護手冊，如有錯誤及最新作物病蟲害用藥，以主管機關公告為準。