

1. 斜紋夜蛾（夜盜蟲、黑蟲、行軍蟲）

危害習性：

幼蟲啃食葉片，雜食性，葉菜類寄主包括十字花科、蔥科、菊科萵苣及茼蒿、菠菜、蕓菜、莧菜、芹菜、羅勒、仙草、落葵、香椿及葉用豌豆等蔬菜，常大發生造成重大疫情。初齡幼蟲集中取食葉片，僅留透明薄膜表皮，3齡幼蟲後食量增大，造成許多大小不一之蟲孔，嚴重時啃食整葉僅殘留主脈。雌蟲產卵塊於葉背（溫度低亦產卵於葉面），卵塊上覆雌蟲黃色體毛，卵塊卵數一百至數百粒，初齡幼蟲具群聚性，3齡後開始分散危害，晝伏夜出，老熟幼蟲土中化蛹，成蟲具趨光性，一般於日落後或陰天活躍。

好發季節：

斜紋夜蛾年發生 8-11 世代，每年 3-5 月及 9-11 月春、秋季為發生盛期，為經常大發生之害蟲，尤其種植田菁等綠肥之田區及附近作物更要注意其發生。



斜紋夜蛾幼蟲取食甘藍葉片



斜紋夜蛾成蛾



斜紋夜蛾卵塊



斜紋夜蛾幼蟲聚集危害