

臺灣常見蔬菜栽培方法

■林念瑾 ●張簡秀容 ●范淑貞 ●張燦如

西洋芹 Celery

科名：繖形花科

別名：洋芹菜、美國芹菜



生育環境條件：性喜冷涼氣候、種子發芽適溫為15~20℃，生育適溫為16~21℃，土壤以有機質壤土，pH值5.6~6.8為宜。

栽培方法：穴盤育苗，幼苗生長至4~5片本葉時，移植至田間。種子催芽方法，將種子浸水24小時之後，水瀝乾，置於5~10℃環境中24小時，即可播種，行距45~60公分，株距25~36公分。栽培品種包括黃色種及綠色種。

芹菜 Celery

科名：繖形花科

別名：旱芹、塘蒿



生育環境條件：性喜冷涼，種子發芽適溫為15~20℃，生育適溫為16~21℃。土壤以富含有機質為宜，pH值5.6~6.8。

栽培方法：撒播或穴盤育苗，種子催芽方法，浸種24時，水瀝乾，放置5~10℃中冷藏24小時，播種，置於20~25℃黑暗中催芽，發芽後搬到育苗管理室育苗至4~5片本葉，移植至田間，行距12~20公分，株距12~15公分，栽培品種有黃心芹菜、海南青（綠種）、田尾種、青筒及夏芹等。

芫荽 Chinese parsley

科名：繖形花科

別名：香菜、胡荽、香芫




生育環境條件：性喜冷涼，生育適溫為17～20℃，長日性植物，12小時以上之日照能促進發育，土壤則以中性保水力好，有機質壤土為宜。

栽培方法：直播，可條播或撒播，播種前將果實輕搓使種子分開，最好先行浸種催芽，溫度以20～25℃為宜。品種有青梗及紅梗。

小胡蘿蔔 Baby carrot

科名：繖形花科

別名：人參蘿蔔



生育環境條件：性喜冷涼，生育適溫為15～25℃，土壤以有機質壤土為宜。

栽培方法：撒播為主，行株距3～5公分，播種之後90天，即可採收。

油菜 Rape

科名：十字花科

別名：油菜心、油菜子



生育環境條件：油菜環境適應能力強而廣泛，發芽適溫為20～25℃，生育適溫15～20℃，對土壤的選擇不嚴，能忍受pH值範圍很大，以排水良好輕鬆肥沃的壤土為最適宜。
栽培方法：以撒播為主，食用品種有綠色種及紅色種（紅油菜）。