

果樹病害防治曆

柑桔病害防治曆

時間	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收期(天)
1 至 3 月	立枯病	砍除病株，以健康種苗更新，並防治媒介昆蟲		
	寄生性線蟲	40%芬滅松乳劑	2,000	春芽萌發實施用
		10%芬滅松粒劑	75 克/株	春芽萌發實施用
		30%滅線蟲粒劑	70 克/株	春芽萌發實施用
		5%丁基加保扶粒劑	200 克/株	春芽萌發實施用
	疫病	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	500	21
		76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	1,000	9
		80%福賽得可濕性粉劑	200	6
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6
	瘡痂病	70%腈硫醃可濕性粉劑	1,000	
		50%免賴得可濕性粉劑	3,000	
		40%快得寧可濕性粉劑	500	
		23%亞托敏水懸劑	3,000	6
4 至 6 月	立枯病	砍除病株，以健康種苗更新，並防治媒介昆蟲		
	疫病	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	500	21
		76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	1,000	9
		80%福賽得可濕性粉劑	200	6
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6
	瘡痂病	70%腈硫醃可濕性粉劑	1,000	
		50%免賴得可濕性粉劑	3,000	
		40%快得寧可濕性粉劑	500	
		23%亞托敏水懸劑	3,000	6
	潰瘍病	72%波爾多可濕性粉劑	500	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	
		56%氧化亞銅可濕性粉劑	600	
		10%維利黴素溶液	800	
	黑點病	22.7%腈硫醃水懸劑	1,000	30
		56%貝芬硫醃可濕性粉劑	800	30
		80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	40
		70%腈硫醃可濕性粉劑	1,000	
	黑星病	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	
		75%四氯異苯腈可濕性粉劑	500	
		50%免賴得可濕性粉劑	3,000	
	油斑病	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	
		50%免賴得可濕性粉劑	3,000	

時間	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收期(天)
7 至 9 月	立枯病	砍除病株，以健康種苗更新，並防治媒介昆蟲		
	疫病	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	500	21
		76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	1,000	9
		80%福賽得可濕性粉劑	200	6
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6
	潰瘍病	72%波爾多可濕性粉劑	500	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	
		56%氧化亞銅可濕性粉劑	600	
		10%維利黴素溶液	800	
	黑點病	70%腈硫醃可濕性粉劑	1,000	30
		56%貝芬硫醃可濕性粉劑	800	30
		80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	40
		22.7%腈硫醃水懸劑	1,000	30
	黑星病	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	30
		75%四氯異苯腈可濕性粉劑	500	
		50%免賴得可濕性粉劑	3,000	
		80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	30
10 至 12 月	油斑病	50%免賴得可濕性粉劑	3,000	
	赤衣病	72%波爾多可濕性粉劑	500	6
	立枯病	砍除病株，以健康種苗更新，並防治媒介昆蟲		
	黑點病 (褐色蒂腐病)	70%腈硫醃可濕性粉劑	1,000	30
		56%貝芬硫醃可濕性粉劑	800	30
	貯藏病害 (綠黴病、褐色蒂腐病、黑色蒂腐病)	40%腐絕可濕性粉劑	500	

梨病害防治曆

時間	主要病害	藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)
1 至 3 月	赤星病	25.9%得克利水基乳劑	2,500	18
		76%富爾邦可濕性粉劑	500	
		5%三泰芬可濕性粉劑	1,000	10
		25%比多農可濕性粉劑	5,000	6
		12%芬瑞莫可濕性粉劑	5,000	5
		11.8%護汰芬水懸劑	2,000	6
	黑星病	11.6%四克利水基乳劑	3,000	6
		50%賽普洛水分散性粒劑	1,500	12
		10%待克利水分散性粒劑	2,000	9
		37%護矜得乳劑	10,000	18

時間	主要病害	藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)
4 至 6 月	赤星病	25.9%得克利水基乳劑	2,500	18
		76%富爾邦可濕性粉劑	500	
		5%三泰芬可濕性粉劑	1,000	10
		25%比多農可濕性粉劑	5,000	6
		12%芬瑞莫可濕性粉劑	5,000	5
	黑星病	11.8%護汰芬水懸劑	2,000	6
		11.6%四克利水基乳劑	3,000	6
		50%賽普洛水分散性粒劑	1,500	12
		10%待克利水分散性粒劑	2,000	9
		37%護矽得乳劑	10,000	18
	輪紋病	23%亞托敏水懸劑	3,000	6
		40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1,000	21
		39.5%扶吉胺水懸劑	2,000	9
		11.76%芬瑞莫乳劑	4,000	6
		40%腐絕可濕性粉劑	1,200	6
	黑斑病	50%撲滅寧可濕性粉劑	1,500	6
		23.7%依普同水懸劑	1,000	6
		50%保粒快得寧可濕性粉劑	1,000	6
7 至 9 月	黑星病	11.8%護汰芬水懸劑	2,000	6
		11.6%四克利水基乳劑	3,000	6
		50%賽普洛水分散性粒劑	1,500	12
		10%待克利水分散性粒劑	2,000	9
		37%護矽得乳劑	10,000	18
	輪紋病	23%亞托敏水懸劑	3,000	6
		40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1,000	21
		39.5%扶吉胺水懸劑	2,000	9
		11.76%芬瑞莫乳劑	4,000	6
		40%腐絕可濕性粉劑	1,200	6
	黑斑病	50%撲滅寧可濕性粉劑	1,500	6
		23.7%依普同水懸劑	1,000	6
		50%保粒快得寧可濕性粉劑	1,000	6
10 至 12 月	褐根病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,000	10
	白紋羽病	39.5%扶吉胺水懸劑	500	
		40%亞賜圃可濕性粉劑	25 公克/株	

柿病害防治曆

時間	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收期(天)
1 至 3 月	褐根病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,000	5
	灰黴病	50%益發靈可濕性粉劑	1,000	9
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	21
4 至 6 月	灰黴病	50%益發靈可濕性粉劑	1,000	9
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	21
	白粉病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,500	5
		25%布瑞莫乳劑	3,000	2
		10.5%平克座乳劑	3,000	6
	角斑病	23.6%百克敏乳劑	3,000	6
		40%邁克尼可濕性粉劑	4,000	6
		40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)粉劑	1,500	9
7 至 9 月	白粉病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,500	5
		25%布瑞莫乳劑	3,000	2
		10.5%平克座乳劑	3,000	6
	角斑病	23.6%百克敏乳劑	3,000	6
		40%邁克尼可濕性粉劑	4,000	6
		40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)粉劑	1,500	9
	炭疽病	39.5%扶吉胺水懸劑	2,000	9
		25%撲克拉水基乳劑	2,000	9
		62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1,500	18
		10%待克利水分散性粒劑	800	21
		50%克收欣水分散性粒劑	2,000	21
		25.9%得克利水基乳劑	2,000	21
10 至 12 月	白粉病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,500	5
		25%布瑞莫乳劑	3,000	2
		10.5%平克座乳劑	3,000	6
	角斑病	23.6%百克敏乳劑	3,000	6
		40%邁克尼可濕性粉劑	4,000	6
		40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)粉劑	1,500	9
	炭疽病	25%撲克拉水基乳劑	2,000	9
		39.5%扶吉胺水懸劑	2,000	9
		10%待克利水分散性粒劑	800	21
		50%克收欣水分散性粒劑	2,000	21
		25.9%得克利水基乳劑	2,000	21
	褐根病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,000	5

桃病害防治曆

時間	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收期(天)
1-3月	縮葉病	42.2%腈硫醃水懸劑	1,000	30
		40%四氯異苯腈水懸劑	700	21
		40%邁克尼可濕性粉劑	3,000	18
		5%菲克利水懸劑	2,000	18
		25%撲克拉水基乳劑	3,000	6
		80%得恩地可濕性粉劑	200	
	穿孔病	16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	1,500	
		68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1,000	24
	菌核病(褐腐病)	50%賽普洛水分散性粒劑	1,000	6
		42.2%腈硫醃水懸劑	1,000	30
		22.8%菲克利腐絕水懸劑	1,000	9
		24.9%特克利乳劑	2,000	9
		37%護矽得乳劑	10,000	9
4-6月	穿孔病	16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	1,500	
		68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1,000	24
	菌核病(褐腐病)	50%賽普洛水分散性粒劑	1,000	6
		42.2%腈硫醃水懸劑	1,000	30
		22.8%菲克利腐絕水懸劑	1,000	9
		24.9%特克利乳劑	2,000	9
		37%護矽得乳劑	10,000	9
	銹病	5%菲克利水懸劑	1,500	6
		23%三泰隆水分散性乳劑	2,000	12
7-9月	穿孔病	16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	1,500	
		68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1,000	24
	銹病	5%菲克利水懸劑	1,500	6
		23%三泰隆水分散性乳劑	2,000	12
10-12月	銹病	5%菲克利水懸劑	1,500	6
		23%三泰隆水分散性乳劑	2,000	12
	褐根病	5%三泰芬可濕性粉劑	1,500	5
		25%撲克拉水基乳劑	3,000	6



柿炭疽病



柿白粉病



柿灰黴病



柿角斑病



褐色蒂腐病



油斑病



黑點病



裾腐病



桃流膠病



柑桔線蟲



桃褐腐病



桃縮葉病



梨赤星病



赤星病



梨黑星病



桃穿孔病



梨輪紋病



梨黑斑病