

北部地區蔬菜

種類 栽培型 項別		播種 (種植期)	播種量 (公斤／公頃)	生育日數	生產期	適宜土壤	行株距
芥藍	周年	1月至 12月	5	30～45天	1月至 12月	排水良好肥厚 粘質壤土	直播：20～30×20～30公分 移植：40～50×40～50公分
芹菜	秋冬播	9月至 2月	3	45～70天	10月至 4月	富有機質之壤土、粘質土或粘質壤土亦可，但排水需良好 pH5.5～6.7	行距：12～20公分 株距：12～15公分
花椰菜	夏播	7月至 8月	0.2～0.3	50～70天	9月至 1月	砂質壤土至粘質壤土 pH6	行距：65～75公分 株距：45～50公分
豌豆	高冷地	9月至 12月	50～60	60～75天	11月中 旬至 2月	粘質壤土或砂質壤土 pH6.0～7.5	行距：60～70公分 株距：25～35公分
胡蘿蔔	秋冬播	9月上旬 至1月	條播：2.5 撒播：4.5	75～120天	11月至 4月	砂質壤土 pH6.0～6.6	畦寬： 1公尺播兩行 株距： 12～15公分
球莖甘藍	秋播	9月至 12月	0.4～0.5	60～90天	10月至 2月	表土深厚富有機質之壤土為最好 pH5.5～6.5	早生品種：40×35公分 中晚生品種：45×40公分
白菜	冬春播	11月中 旬至 2月	12	30～50天	12月中 旬至 3月下旬	砂質壤土至粘質壤土	撒播

栽培作業曆

栽培管理：范淑貞

土壤肥料：廖乾華 聯合執筆
莊浚釗

主要栽培品種	施肥量 (公斤/公頃)	肥料施用法
白花芥藍 黃花芥藍 大葉晚生芥藍 黃金嫩葉 甘藍葉芥藍	堆肥：1200 尿素：650 氯化鉀：250 過磷酸鈣：1000 氯化鉀：400—600	基肥：堆肥、過磷酸鈣、氯化鉀全部 尿素60% 追肥：尿素40%分兩次施用。
海南青 黃心 白骨青葉 青骨青葉	堆肥：20000 或木屑雞糞3000 尿素：300—460 過磷酸鈣：330—500 氯化鉀：250—300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分兩次施用 於發芽後30—40天、60—70天 各施一次。
農友早生1號 農友早生2號 農友早生3號 50天早生 60天早生	堆肥：10000—20000 或雞糞2000—3000 尿素：460 過磷酸鈣：600 氯化鉀：300	基肥：堆肥100%、尿素1/3、過磷 過磷酸鈣2/3、氯化鉀2/3 追肥：尿素2/3、過磷酸鈣、 氯化鉀1/3分兩次追肥施用。
台灣白花(軟莢) 台中十一號 台中九號(軟莢) 台中十二號 甜豌豆： 台中十三號 新珍	堆肥：10000 尿素：40—90 過磷酸鈣：280—440 氯化鉀：100—150	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀1/2 追肥：尿素、氯化鉀1/2分兩次於 發芽後每隔15—20天施用。
新黑田五寸 紅心五寸 黑田五寸	堆肥：5000—10000 或木屑雞糞3000 尿素：390—540 過磷酸鈣：670—1000 氯化鉀：200—300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部 氯化鉀50% 追肥：尿素50%、氯化鉀50%分兩次 於發芽後15—30天及45—60天 施用。
金門早生 北平晚生 白燕早生	堆肥：10000 尿素：220—260 過磷酸鈣：390—500 氯化鉀：200—250	基肥：堆肥全部、過磷酸鈣全部、 氯化鉀1/3、尿素1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次於 定植後每隔15—20天施用。
圓葉山東 切葉山東菜 日本白菜	過磷酸鈣：500 氯化鉀：160—250 尿素：260	基肥：過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀40% 追肥：尿素、氯化鉀60%分一至二次 施用(視情形而定)。

種類 栽培型 項別		播種 (種植期)	播種量 (公斤／公頃)	生育日數	生產期	適宜土壤	行株距
萵 苣	秋冬播	9月 至 12月	0.3~0.4	30~35天	10月 至 2月	富有機質、保 水佳排水良好 的砂質壤土或 粘質壤土 pH6.0~6.3	間拔：2~3次 株距：6~7次
菠 菜	秋冬播	9月上旬 至 2月中旬	秋播：50 冬播： 30~50	50~60天	10月 至 4月	表土深厚排水 良好富腐植土 pH6.0~7.0	撒播
薺 菜	周年	1月 至 12月	15~30	30~40天	1月 至 12月	砂質壤土至 粘質壤土 pH5.3~6.0	撒播 條播 育苗移植：行距：30公分 株距：15公分
茼 蒿	秋冬播	9月上旬 至 2月中旬	12~18	25~35天	10月 至 3月上旬	砂質壤土至 粘質壤土 pH5.5~6.8	經苗長約3公分時，間拔留 行株距12×12公分
結球白菜	秋冬播	9月 至 11月	0.8~1.0	40~65天	11月 至 1月	表土深厚富有 機質的沖積土 pH6.3~6.8	漳浦早生 濱綠：50~60×35~40公分 長岡交配60天 65~70×45~50公分 一般的50~70×35~50公分
葱	周年	1月 至 12月	分株繁殖	60~70天	1月 至 12月	粘質土壤或 腐植質壤土 pH5.7~7.4	行距：20公分 畦寬130公分六行植 株距18公分 或畦寬100公分六行植 株距20公分

主 要 栽 培 品 種	施 肥 量 (公斤／公頃)	肥 料 施 用 法
嫩莖萵苣 結球萵苣： 白波士頓 雄魁、夏綠、辛浦生 葉萵苣： 本地白萵	堆肥：5000（木屑雞糞3000） 尿素：220—260 過磷酸鈣：280—560 氯化鉀：150—200	基肥：堆肥全部、過磷酸全部、 尿素、氯化鉀50% 追肥：尿素、氯化鉀50%分於 本葉3—4葉施用。
禹 城 牛若丸 新亞細亞	堆肥：20000 或木屑雞糞3000 尿素：330—390 過磷酸鈣：500—670 氯化鉀：200—250	基肥：堆肥全部、磷肥全部 氮肥、氯化鉀1／4 追肥：氮肥、鉀肥3／4分三次於發芽 後7—10、14—15天、25—30 天施用。
大葉種 中葉種 小葉種 竹葉種	堆肥：10000 尿素：260—390 過磷酸鈣：280—500 氯化鉀：170—250	基肥：尿素、氯化鉀佔1／3、過磷酸鈣100% 追肥：尿素、氯化鉀75%分兩次 於播種10—12天、18—20天施用。
虎耳大葉 (圓葉種) 切 葉(裂葉種) 匙 葉(匙葉種)	堆肥：15000 硫酸銨：1400 過磷酸鈣：900 氯化鉀：250 氮素：200	基肥：堆肥、硫酸銨、氯化鉀、 過磷酸鈣、草木灰全部 追肥：尿素於採收前行2—3次 葉面噴施。
濱 綠 長岡交配60天 新霸王	堆肥：10000 尿素：430—540 過磷酸鈣：500—840 氯化鉀：200—300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、 尿素、氯化鉀1／3 追肥：尿素、氯化鉀2／3分三次於 發芽後15—29天、30—35天、 45—50天施用。
九條葱 (四季葱)	堆肥：20000 或木屑雞糞30000 尿素：350—430 過磷酸鈣：550—660 氯化鉀：250—330	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀25% 追肥：尿素、氯化鉀75%分三次於 定植後每隔15—20天施用。