

# 北部地區蔬菜

| 種類  | 主要病害及防治藥劑                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要蟲害及防治藥劑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 芥藍  | <p>苗立枯病—35%伊得利可濕性粉劑，播種同時施藥。<br/>25%伊得利乳劑，播種同時施藥。</p> <p>露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>72%鋅鋁克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。</p> <p>黑斑病—21.2%依滅列乳劑，採收前6天停止施藥。<br/>75%四氫異苯肅可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p>                                                          | <p>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br/>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次，採收前14天停止施藥。<br/>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。<br/>25%陶斯寧乳劑，採收前9天停止施藥。<br/>10%芬普寧乳劑，採收前12天停止施藥。</p> <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，芥藍採收前9天停止施藥。<br/>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。</p> <p>紋白蝶—3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br/>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。<br/>5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。</p>                                        |
| 芹菜  | <p>嵌紋病—以有機磷劑防除蚜蟲，或拔除病株並燒燬。</p> <p>菌核病—尚無推薦藥劑。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br/>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。</p> <p>切根蟲—8%托美松，限種植前使用。<br/>22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。<br/>25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 花椰菜 | <p>露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>72%鋅鋁克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。</p> <p>黑斑病—同芥藍。</p> <p>軟腐病—12.5%鏈黴素或68%多保鏈黴素於花初形成時施藥，採收前14天停止施藥。</p> <p>細菌黑腐病—以1%醋酸鋅於35°C之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。</p> <p>黑煤病—以殺蟲劑防除蚜蟲。</p> <p>缺硼症—施用硼砂，每公頃2公斤，絕不可增量，否則會導致葉片焦枯。</p> | <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br/>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。</p> <p>紋白蝶—3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br/>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。<br/>5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。</p> <p>菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。<br/>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。</p> <p>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br/>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br/>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>擬尺蠖—5%芬化利乳劑，採收前10天停止施藥。<br/>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。<br/>5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。</p> |
| 豌豆  | <p>菌核病—尚無推薦藥劑。</p> <p>炭疽病—尚無推薦藥劑。</p> <p>白粉病—10.5%平克座乳劑，採收前6天停止施藥。</p> <p>褐斑病—尚無推薦藥劑。</p> <p>苗立枯病—以5%脫克松拌種後種植，每公斤0.5公克藥劑。</p> <p>銹病—30%三得寧乳劑，採收前6天停止施藥。<br/>33%鋅鋁乃浦水懸劑，採收前12天停止施藥。</p>                                                                                | <p>豆潛蠅—40.6%加保扶水懸液於發芽開始施藥二次，間隔一星期。</p> <p>紅蜘蛛—2.8%畢芬寧乳劑，採收前6天停止施藥。<br/>10%合賽多可濕性粉劑，採收前20天停止施藥。</p> <p>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br/>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br/>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。</p> <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採豆莢者限開花前使用。<br/>採豆苗者採收前6天停止施藥。<br/>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br/>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。</p>                                                            |

# 病蟲害防治曆

病害：葉俊巖 聯合執筆  
蟲害：李聯興

| 種類               | 主要病害及防治藥劑                                                                                                                                                          | 主要蟲害及防治藥劑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胡<br>蘿<br>蔔      | 腐敗病—尚無推薦藥劑。<br>黑葉枯病—尚無推薦藥劑。                                                                                                                                        | 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。<br>根瘤線蟲—10%芬滅松粒劑，僅可於播種前施於植床。                                                                                                                                                       |
| 球<br>莖<br>甘<br>藍 | 霉菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>72%鋅鋁克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。<br>黑腐病—以1%醋酸鋅於35°C之溫度浸種<br>10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。                                       | 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。<br>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。<br>25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天停止施藥。<br>10%芬普寧乳劑，採收前9天停止施藥。<br>蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。<br>菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。<br>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。<br>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 |
| 白<br><br><br>菜   | 霉菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>72%鋅鋁克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。<br>軟腐病—尚無推薦藥劑。<br>黑斑病—同芥藍。                                                        | 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。<br>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施藥。<br>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。<br>黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。<br>50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。                          |
| 萵<br>苣           | 立枯病—播種後立即施用伊得利稀釋液。<br>菌核病—50%免克寧可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>50%大克爛可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>50%撲滅寧可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>霉菌病—85%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>58%鋅鋁滅達可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 | 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>切根蟲—8%托美松，限種植前使用。<br>22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。<br>25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。                                                                                                                                          |

| 種類   | 主要病害及防治藥劑                                                                                                                                                                                                    | 主要蟲害及防治藥劑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 菠菜   | <p>露菌病—72.5%銅鋅錳乃浦可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>70%鋅錳賽得可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>毒素病—拔除病株並燒燬，以免蔓延。</p> <p>炭疽病—尚無推薦藥劑。</p> <p>立枯病—播種後立即澆伊得利稀釋液，一次即可。</p>                                                             | <p>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。</p> <p>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。</p> <p>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。</p> <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。</p> <p>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。</p> <p>擬尺蠖—5%芬化利乳劑，採收前10天停止施藥。</p> <p>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。</p> <p>5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 薺菜   | <p>白銹病—尚無推薦藥劑。</p>                                                                                                                                                                                           | <p>龜葉金花蟲—50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>斜紋夜盜—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。</p> <p>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。</p> <p>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 茼蒿   | <p>炭疽病—尚無推薦藥劑。</p> <p>葉枯病—尚無推薦藥劑。</p> <p>立枯病—播種後立即澆伊得利稀釋液。</p>                                                                                                                                               | <p>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。</p> <p>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。</p> <p>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。</p> <p>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 結球白菜 | <p>黑腐病—以1%醋酸鋅於35°C之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。</p> <p>軟腐病—12.5%鏈黴素或68%多保鏈黴素於花初形成時施藥，採收前14天停止施藥。</p> <p>露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。</p> <p>黑斑病—同芥藍。</p> | <p>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。</p> <p>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。</p> <p>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。</p> <p>蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。</p> <p>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。</p> <p>菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。</p> <p>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。</p> <p>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。</p> <p>切根蟲—8%托美松，限種植前使用。</p> <p>22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。</p> <p>25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。</p> <p>小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。</p> <p>25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天，小葉菜類採收前9天停止施藥。</p> <p>10%芬普寧乳劑，包葉菜類採收前9天，小葉菜類採收前12天停止施藥。</p> <p>蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次</p> <p>黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。</p> <p>50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。</p> |
| 蔥    | <p>黑斑病—23.7%依普同水懸劑，採收前15天停止施藥。</p> <p>赤銹病—47%三得錳可濕性粉劑，濃度提高會發生藥害。</p> <p>50%賜加落可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p> <p>65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。</p> <p>露菌病—85%鋅錳乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p>                                          | <p>薊馬—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。</p> <p>葉潛蠅—50%益滅松可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |