

北部地區蔬菜

種類 栽培型 項別		播種 (種植期)	播種量 (公斤／公頃)	生育日數	生產期	適宜土壤	行株距
甜 椒	高冷地	3月至4月	0.4~0.6	75~90天	6月至7月	土層深厚砂質壤土或壤土 pH5.5~6.8	定植時矮性品種 行距：60公分 株距：40公分 其他品種 行距：65公分 株距：45公分
胡 瓜	春夏	2月上旬至 5月下旬	0.7~0.75	30~40天	3月至6月	富有機質之砂質壤土 pH5.7~7.0	大胡瓜： 行距：70公分 株距：45~50公分 小胡瓜： 行距：70公分 株距：36~40公分
苦 瓜	春夏作	12月至4月	0.2~0.4	定植後 50~70天	4月至8月	排水良好的砂質壤土至粘質壤土 pH5.5~6.5	匍地栽培： 行距：3~3.5公尺 株距：1.5~1.8公尺 棚架栽培： 行距：2.5~3公尺 行距：1.5~1.8公尺
甜 瓜	春夏作	2月至6月	0.4~0.6	開花後 30~35天	5月至8月	排水良好之砂質壤土或壤土 pH6.0~6.6	行距：2.0~2.5公尺 株距：60~80公分
洋 香 瓜	春夏作	2月至 6月	0.3~0.5	80~90天	5月至 8月	排水良好的砂質壤土至黏質壤土 pH6.0~6.8	行距：2.0公尺 株距：0.5公尺
西 瓜	春播	2月至 6月	0.2~0.3	70~120天	5月至 10月	排水良好土質深厚的疏鬆土壤 pH5.0~7.0	大型西瓜： 行距：2.1公尺 株距：2.1公尺 小型西瓜春夏作： 畦寬：3.6公尺 株距：1.2公尺

栽培作業曆

栽培管理：范淑貞

土壤肥料：廖乾華

莊浚釗

聯合執筆

主要栽培品種	施肥量 (公斤/公頃)	肥料施用法
天王星 女王星 藍星 巨星 明星	堆肥：15000—20000 尿素：300 過磷酸鈣：750 氯化鉀：300	基肥：堆肥全部、尿素20%、過磷酸鈣55%、氯化鉀70% 追肥：尿素80%分三次施用、過磷酸鈣45%、氯化鉀30%分兩次施用，每隔10—15天追肥一次。
宜蘭種 內湖種 新市三號 飛燕 春燕 喜燕	堆肥：10000—15000 尿素：640—700 過磷酸鈣：820—970 氯化鉀：400—500	基肥：堆肥100%、尿素20%、過磷酸鈣60%、氯化鉀20% 追肥：尿素80%分五次施用、過磷酸鈣40%施用於第一、二次、氯化鉀80%施用於第一、二、三、四次，每隔8—10天追肥一次。
大果種 農友二號 香港青皮 月華	堆肥：12000 硫酸銨：1000 過磷酸鈣：600 氯化鉀：300	基肥：堆肥100%、硫酸銨20%、過磷酸鈣50%、氯化鉀50% 追肥：硫酸銨80%分四次、過磷酸鈣50%、氯化鉀50%於第二、三追肥施用，每隔三週追肥一次。
銀輝 金輝 新玉	堆肥：15000—20000 硫酸銨：950 過磷酸鈣：800 氯化鉀：300	基肥：堆肥100%、硫酸銨40%、過磷酸鈣50%、氯化鉀50% 追肥：硫酸銨60%分三次、過磷酸鈣50%於第二次、氯化鉀50%於第二、三次施用，本葉3—4枚一追，蔓長30—40公分二追，小果期三追。
香蘭 秋香 天香 新世紀	堆肥：10000或雞糞3000 硫酸銨：700 過磷酸鈣：1000 氯化鉀：300	基肥：堆肥100%、硫酸銨20%、過磷酸鈣50%(粘質壤土100%) 氯化鉀40% 追肥：硫酸銨80%分四次，過磷酸鈣50%分於第二、三次，鉀肥於二、三、四次施用，定植後每隔10天追肥一次。
富寶二號 農友抗病610 新龍 特小鳳 金蘭	堆肥：12000 硫酸銨：850 過磷酸鈣：600 氯化鉀：350	基肥：堆肥100%、硫酸銨15%、過磷酸鈣60%、氯化鉀25% 追肥：硫酸銨90%分五次施用、過磷酸鈣40%於第二～三次施用，氯化鉀75%於第二～四次施用，定植後每隔10—14天追肥一次。

種 類 栽培型 項 別		播 種 (種植期)	播種量 (公斤／公頃)	生育日數	生產期	適宜土壤	行 株 距
菜 豆 (四季豆)	春播	2 月 至 4 月	矮性品種 60~70 蔓性品種 50~55	40~55天	3月中旬至 5月中旬	排水良好，砂質 壤土或壤土 pH5.3~6.3	矮性品種： 行距：50公分 株距：20~25公分 蔓性品種： 行距：60公分 株距：30~36公分
碗 豆	高冷地	3 月 至 6 月	50~60	60~75天	5 月 至 9 月	排水良好粘質 壤土、砂質壤土 pH6.0~7.5	行距：60~70公分 株距：25~35公分
甘 藍	夏播	4 月 至 8 月	0.3~0.5	60天~85天	5月中旬 至9月	適應性甚廣，但 以排水良好砂質 壤土至粘質壤土 pH不可低於 pH5.5	行距：60~75公分 株距：40~54公分
莧 菜	夏播	3 月 至 10月	1.4	25~40天	4月至11月	砂質壤土至 粘質壤土 pH5.5~7.0	撒 播 條 播
結球白菜	夏播	4 月 至 8 月	0.8~1.0	40~65天	5月中 旬 至9月	表土深厚富有 機質的沖積土 pH5.5~6.8	漳浦早生 濱綠：50~60×35~40公分 長岡交配60天 65~70×45~50公分 一般的50~70×35~50公分
絲 瓜	春播	11月下旬 至 3月中旬	1.6	100~120天	3月至7月	富有機質之砂 質壤土及壤土 pH5.8~6.8	匍 匐 式：行距：2.7 株 距：1.2公尺 隧道棚式：行距：3.0公尺 株 距：1.2公尺 水平棚式：行距：2.0公尺 株距：1.2公尺
扁 蒲	春播	2 月 至 4 月	0.8~1.2	開花後 7~14天	4月至7月	排水良好的砂質 壤土或腐植土 pH6.0~7.5	行距：4公尺 株距：1.5公尺
南 瓜	春夏作	2 月 至 6 月	0.4~0.6	70~85天	5月至10月	排水良好的砂質 壤土或壤土 pH5.0~7.5	行距：3公尺 株距：1.5公尺

主 要 栽 培 品 種	施 肥 量 (公斤/公頃)	肥 料 施 用 法
白仁軟莢 衣笠 青湖 台中一號 泰國種	堆肥：20000 尿素：200 過磷酸鈣：500 氯化鉀：200	基肥：堆肥100%、過磷酸鈣60%、 氯化鉀50% 追肥：尿素70%分三次施用、氯化鉀 50%於第二、三次追肥施用、 過磷酸鈣40%於第二次追肥施 用，追肥係發芽後每隔15天施 用一次。
台灣白花(軟莢) 台中九號(軟莢) 台中十一號 台中十二號 甜碗豆： 台中十三號 新珍	堆肥：10000 尿素：100 過磷酸鈣：330 氯化鉀：100	基肥：堆肥全部、尿素、過磷酸鈣1/2 、氯化鉀2/3 追肥：尿素、過磷酸鈣1/2氯化鉀1/3 分二次施用，每隔15~20天施用 一次。
長岡交配60天 夏峰、高峰 夏秋、初秋	堆肥：10000或木屑雞糞3000 尿素：450-600 過磷酸鈣：400-500 氯化鉀：200-300	基肥：堆肥、過磷酸鈣100%尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次於定 植後每10-15天施用。
虎耳白莧 虎耳紅莧 虎莧 白王	堆肥：10000或木屑雞糞3000 尿素：260 過磷酸鈣：280 氯化鉀：80	基肥：堆肥全部、過磷酸鈣全部、氯 化鉀全部、尿素50% 追肥：尿素及氯化鉀50%分兩次施用 ，發芽後7-10天施用一次。
無雙、新霸王、 長岡交配60天 濱綠、元寶二號 夏寶、亞蔬一號 桃園亞蔬二號	堆肥：10000或木屑雞糞3000 尿素：430-540 過磷酸鈣：500-830 氯化鉀：200-300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次於發 芽後15-20天、30-35天、45 -50天施用。
米管種 竹竿種 長筒種	堆肥：15000-20000 尿素：210-330 氯化鉀：200-240 過磷酸鈣：500	基肥：堆肥100%、過磷酸鈣100% 追肥：尿素100%、氯化鉀100%分四 ~五次施用。於移植後每隔10 -15天追肥一次。
長型：牛腿蒲 目蒲 冬瓜蒲 圓型：酒釭匏 虎皮匏	堆肥：7500 尿素：150 過磷酸鈣：300 氯化鉀：150	基肥：堆肥100%、過磷酸鈣60% 追肥：尿素、氯化鉀100%分兩次各 半施用。第一次追肥於定植 後10天，再隔20-30天第二 次追肥。
木瓜型 在來種大南瓜	堆肥：10000 硫酸銨：500 過磷酸鈣：550 氯化鉀：250	基肥：堆肥100%、過磷酸鈣40%、 硫酸銨30%、氯化鉀40% 追肥：硫酸銨70%、過磷酸鈣60%、 氯化鉀60%各分三次施用，每 隔15-20天施用一次。