# 北部地區蔬菜

| 種類 | 主要病害及防治藥劑 | 主要蟲害及防治藥劑 |
|---|---|---|
| 甜椒 | 青枯病—整地時即須施用SH土壤添加物，每分地120－150公斤，並栽植抗或耐病品種。<br>疫　病—80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>軟腐病—尚無推薦藥劑。<br>毒素病—使用殺蟲劑防除蚜蟲，並拔除病株燒燬。 | 蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>紅蜘蛛—10%福瑞松粒劑，定植前施用，栽植期間不可施用。<br>甜菜夜蛾—2.8%畢芬寧乳劑，採收前10天停止施藥。<br>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 |
| 胡瓜 | 露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>白粉病—5%菲克利水懸劑，採收前14天停止施藥。<br>12%邁尼克乳劑，採收前3天停止施藥。<br>5%三泰芬可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>毒素病—拔除病株並燒燬，並防除蚜蟲。 | 黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。 |
| 苦瓜 | 露菌病—64%甲基歐殺斯可濕性粉劑，採收前6天停用。<br>80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>75%免得克絕可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 | 瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。<br>黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。 |
| 甜瓜 | 白粉病—10.5%平克座乳劑，採收前6天停止施藥。<br>13.4%邁克尼乳劑，採收前3天停止施藥。<br>11.76%芬莫瑞可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>炭疽病—65%貝芬得可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>25%撲克拉乳劑，採收前10天停止施藥。<br>70%甲基鋅乃浦，採收前10天停止施藥。<br>蔓枯病—18%貝芬寧水懸劑，採收前15天停止施藥。<br>60%得滅寧可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>露菌病—80%免得爛可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>39.5%普拔克溶液，採收前6天停止施藥。 | 瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。<br>黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 |
| 洋香瓜 | 白粉病—10.5%平克座乳劑，採收前6天停止施藥。<br>13.4%邁克尼乳劑，採收前3天停止施藥。<br>11.76%芬莫瑞可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>炭疽病—65%貝芬得可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>25%撲克拉乳劑，採收前10天停止施藥。<br>70%甲基鋅乃浦，採收前10天停止施藥。<br>蔓枯病—18%貝芬寧水懸劑，採收前15天停止施藥。<br>60%得滅寧可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>露菌病—80%免得爛可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>39.5%普拔克溶液，採收前6天停止施藥。 | 瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。<br>黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 |

# 病蟲害防治曆

病害：葉俊巖
蟲害：李聯興
聯合執筆

| 種類 | 主要病害及防治藥劑 | 主要蟲害及防治藥劑 |
|---|---|---|
| 西瓜 | 蔓割病—74%貝芬錳可濕性粉劑，並於整地同時施用SH添加物，每分地120－150公斤。<br>蔓枯病—18%貝芬寧水懸劑，採收前15天停止施藥。<br>60%得滅寧可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>炭疽病—65%貝芬得可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>25%撲克拉乳劑，採收前10天停止施藥。<br>70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 | 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>葉潛蠅—50%益滅松可濕性粉劑採收前7天停止施藥。<br>線　蟲—定植前以歐殺滅粒劑或滅線蟲粒劑施於植床，定植後不准施藥。 |
| 菜豆（四季豆） | 銹　病－30%三得寧乳劑，採收前6天停止施藥。<br>33%鋅錳乃浦水懸劑，採收前12天停止施藥。<br>炭疽病－尚無推薦藥劑。 | 豆潛蠅—40.6%加保扶水懸液於發芽開始施藥二次，間隔一星期。<br>紅蜘蛛—2.8%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 |
| 豌豆 | 菌核病—尚無推薦藥劑。<br>炭疽病—尚無推薦藥劑。<br>白粉病—10.5%平克座乳劑，採收前6天停止施藥。<br>褐斑病—尚無推薦藥劑。<br>苗立枯病—以5%脫克松拌種後種植，每公斤0.5公克藥劑<br>銹　病—30%三得寧乳劑，採收前6天停止施藥。<br>33%鋅錳乃浦水懸劑，採收前12天停止施藥。 | 豆潛蠅—40.6%加保扶水懸液於發芽開始施藥二次，間隔一星期。<br>紅蜘蛛—2.8%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>10%合賽多粒劑可濕性粉劑，採收前20天停止使用。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採豆莢者限開花前使用。採豆苗者採收前6天停用。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 |
| 甘藍 | 苗立枯病—播種後立即施用35%或25%伊得利稀釋液。<br>露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。<br>黑腐病—以1%醋酸鋅於35°C之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。<br>軟腐病—12.5%鍊黴素或68%多保鍊黴素於花初形成時施藥，採收前14天停止施藥。 | 小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。<br>25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天，小葉菜類採收前9天停止施藥。<br>10%芬普寧乳劑，採收前9天停止施藥。<br>蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。<br>切根蟲—8%托美松粒劑，限種植前使用。<br>22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。<br>25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。<br>夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>紋白蝶—3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。<br>5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。 |

| 種類 | 主要病害及防治藥劑 | 主要蟲害及防治藥劑 |
| --- | --- | --- |
| 莧菜 | 白粉病—尚無推薦藥劑。 | 紅蜘蛛—25.1%畢芬寧乳劑，採收前6天停止施藥。 |
| 結球白菜 | 黑腐病—以1%醋酸鋅於35°C之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。<br>軟腐病—12.5%鍊黴素或68%多保鍊黴素於花初形成時施藥，採收前14天停止施藥。<br>露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。 | 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。<br>25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。<br>3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。<br>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。<br>切根蟲—8%托美松粒劑，限種植前使用。<br>22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。<br>25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。<br>小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。<br>25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天，小葉菜類採收前9天停止施藥。<br>10%芬普寧乳劑，包葉菜類採收前9天停止施藥，小葉菜類採收前12天停止施藥。<br>蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。<br>黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。<br>50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 |
| 絲瓜 | 露菌病—80%免得爛可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前12天停止施藥<br>39.5%普拔克溶液，採收前6天停止施藥。<br>炭疽病—65%貝芬得可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>25%撲克拉乳劑，採收前10天停止施藥。<br>70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。 | 黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，絲瓜採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。<br>瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。 |
| 扁蒲 | 白粉病—10.5%平克座乳劑，採收前6天停止施藥。<br>13.4%邁克尼乳劑，採收前3天停止施藥。<br>11.76%芬莫瑞可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>炭疽病—65%貝芬得可濕性粉劑，採收前9天停止施藥。<br>25%撲克拉乳劑，採收前10天停止施藥。<br>70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>毒素病—用殺蟲劑防除蚜蟲。 | 蚜　蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。<br>50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。<br>50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。<br>黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。 |
| 南瓜 | 白粉病—10.5%平克座乳劑，採收前6天停止施藥。<br>13.4%邁克尼乳劑，採收前3天停止施藥。<br>11.76%芬莫瑞可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。<br>露菌病—80%免得爛可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。<br>72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前12天停止施藥<br>39.5%普拔克溶液，採收前6天停止施藥。<br>毒素病—用殺蟲劑防除蚜蟲。 | 黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。<br>瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。 |