

北部地區蔬菜

栽培型 種類		項別	播種 (種植)期	播種量 (公斤/公頃)	生育日數	生產期	適宜土壤	行 株距
芥藍	周年		1月至12月	5	30~45天	1月至12月	中性粘質壤土、砂質土、砂質壤土，pH 中性至微鹼性	直播：20~30×20~30公分 移植：40~50×40~50公分
芹菜	夏播		3月至7月	3	45~70天	5月至9月	富有機質之壤土、粘質土或粘質壤土亦可，但排水需良好 pH5.5~6.7	行距：12~20公分 株距：12~15公分
花椰菜	夏播		7月至8月	0.2~0.3	50~70天	9月至1月	有機質之砂質壤土至粘質壤土 pH6	行距：65~75公分 株距：45~50公分
番茄	秋播		8月上旬至10月	0.3	50~70天	4月上旬至6月	砂質壤土至粘質壤土 pH6.4	立支柱：畦寬120公分兩行 株距45公分 無立支柱：畦寬100公分一行 株距40公分
胡瓜	秋播		8月中旬至9月下旬	0.7~0.75	30~40天	9月至11月	富有機質之砂質壤土 pH5.7~7.0	大胡瓜： 行距：70公分 株距：45~50公分
	高冷地		1月~7月			3月至9月		小胡瓜： 行距：70公分 株距：36~40公分
菜豆(四季豆)	秋播 高冷地		8月至10月	矮性品種 60~70 蔓性品種 50~55	40~55天	9月中旬至12月	排水良好，砂質壤土、粘質壤土 pH5.3~6.3	矮性品種： 行距：50公分 株距：20~25公分 蔓性品種： 行距：60公分 株距：30~36公分
蘿蔔	夏播		6月至10月	5.5	40~60天 75~80天	8月至12月	砂質壤土及壤土 pH5.8~6.8	行距：45公分 株距：20~25公分

栽培作業曆

栽培管理：范淑貞

土壤肥料：廖乾華 聯合執筆
莊浚釗

主要栽培品種	施 肥 量 (公斤/公頃)	肥料施用法
白花芥藍 黃花芥藍 黃金嫩葉	堆肥：12000(或木屑雞糞3000) 尿素：650 過磷酸鈣：1000 氯化鉀：400~600	基肥：堆肥、過磷酸鈣、氯化鉀全部、 尿素60%。 追肥：尿素、氯化鉀70%分兩次施用。
青骨青葉 海南青	堆肥：20000(或木屑雞糞3000) 尿素：330~500 過磷酸鈣：330~500 氯化鉀：250~300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分兩次於發芽後 30~40天及60~70天施用。
40天早生種 鳳山極早生	堆肥：12000~15000 (或木屑雞糞3000) 尿素：480~560 過磷酸鈣：500~830 氯化鉀：250~350	基肥：堆肥100%、尿素40%、 過磷酸鈣100%、氯化鉀50%。 追肥：尿素60%分三~四次追肥施用。 氯化鉀50%於二次追肥施用。
台中亞蔬四號 花蓮亞蔬五號 雙福	堆肥：20000 尿素：350~430 過磷酸鈣：560~830 氯化鉀：170~250 硼砂：5(缺硼土壤才施用)	基肥：堆肥、過磷酸鈣、硼砂全部、 尿素1/3、氯化鉀1/3 追肥：尿素2/3、氯化鉀2/3分三次， 每隔20~25天施用。
雙頭齊 喜燕 飛燕 春燕	堆肥：10000 尿素：540~760 過磷酸鈣：670~1000 氯化鉀：500~670	基肥：堆肥100%、尿素10%、 過磷酸鈣60%、氯化鉀20% 追肥：尿素90%分五次施用， 過磷酸鈣40%施用於第一、二次， 氯化鉀80%於第二、四次施用。
白仁軟莢 衣笠 青湖 台中一號 泰國種	堆肥：20000 尿素：200~260 過磷酸鈣：330~500 氯化鉀：170~200	基肥：堆肥100%、過磷酸鈣100%、 氯化鉀50%、尿素30% 追肥：尿素70%分三次(30%、20%、10%) 施用，氯化鉀50%分兩次於二、 三次各半施用。
60日矸子 大白杙 矸仔杙	過磷酸鈣：440~560 氯化鉀：180~220 尿素：300~350	基肥：尿素40%、過磷酸鈣100%、 氯化鉀60% 追肥：尿素60%分三次施用(15%、20% 、25%)及氯化鉀40%分兩次於二、 三追各半施用。

栽培型 種類		項別	播 種 (種植)期	播種量 (公斤／公頃)	生育日期	生產期	適宜土壤	行 株 距
甘 藍	夏 播		4月至8月	0.3~0.5	60~85天	5月中旬 至9月	適應性甚廣，但 以砂質壤土至粘 質壤土 pH不可低於 5.5以下	行距：60~75公分 株距：40~54公分
	高 冷地		2月中旬至 5月上旬			7月上旬 至8月		
白 菜	夏 秋 播		3月至 11月上旬	12	30~50天	4月下旬 至12月	砂質壤土至粘質 壤土 pH5.0~6.0	撒播
萵 苣	夏 播		3月至8月	0.3~0.4	30~35天	4月至 10月中	富有機質的砂質 壤土或粘質壤土 pH6~6.3	間拔：2~3次 株距：6~7次
芥 菜	夏 播		3月下旬 至9月上旬	0.2	20~25天	4月至 10月	砂質壤土至粘質 壤土 pH5.5~6.8	行距：60公分 株距：50公分
薺 菜	周 年		1月至12月	30~60	25~40天	1月至12月	砂質壤土至粘質 壤土 pH5.3~6.0	撒播 條播 育苗移植： 行距：20公分 株距：10公分
莧 菜	夏 播		3月至8月	0.5~2.0	25~40天	4月至9月	砂質壤土至粘土 pH5.5~7.0	撒播 條播
結 球 白 菜	夏 播		4月至8月	0.8~1.0	40~65天	5月中旬 至9月	表土深厚富有機 質且排水良好的 沖積土 pH 5.5~6.8	漳浦早生 濱綠：50~60×35~40公分 一般的：50~70×35~50公分
	高 冷地		3月上旬 至5月			5月至7月		

各位農友：

北部地區蔬菜栽培作業曆及病蟲害防治曆已連載完畢，本場正行編抽印本，有需要的農友，請於七月底前來函註明「索取北部地區蔬菜栽培作業曆及病蟲害防治曆抽印本」，並附5元郵票，以利寄送，謝謝您！

編輯部 啓

主要栽培品種	施 肥 量 (公斤/公頃)	肥 料 施 用 法
初秋 夏峰 夏秋	堆肥：10000(或木屑雞糞3000) 尿素：540~760 過磷酸鈣：390~500 氯化鉀：200~300	基肥：堆肥、過磷酸鈣100%、尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次施用。
黃金白菜 青梗白菜 農友1號白菜 油菜	過磷酸鈣：220~440 氯化鉀：130~1800 尿素：240~330	基肥：過磷酸鈣全部、尿素、氯化鉀40% 追肥：尿素、氯化鉀69%分 一~二次施用(視情形而定)。
本地白萵 美國白萵	堆肥：5000(或木屑雞糞3000) 尿素：220~260 過磷酸鈣：280~560 氯化鉀：150~200 硼砂：1(缺硼土壤才施用)	基肥：堆肥全部、過磷酸鈣全部、 硼砂全部、尿素、氯化鉀50% 追肥：尿素、氯化鉀50%分 一~二次施用。
竹子葉(加工用) 粉甲 扁甲 雪裡紅	堆肥：10000~20000 (或木屑雞糞3000) 尿素：390~520 過磷酸鈣：500~670 氯化鉀：250~300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次施用
大葉種 小葉種	堆肥：10000 尿素：260~390 過磷酸鈣：280~500 氯化鉀：170~250	基肥：尿素、氯化鉀佔34% 、過磷酸鈣100% 追肥：尿素、氯化鉀66%分兩次施用。
虎耳白萵 虎耳紅萵 虎萵 白玉	堆肥：10000(或木屑雞糞3000) 尿素：260 過磷酸鈣：280 氯化鉀：80	基肥：堆肥全部、過磷酸鈣全部、 氯化鉀50%及尿素 追肥：尿素及氯化鉀50%分一~二次施用。
濱綠 桃園亞蔬二號 夏寶一號	堆肥：10000(或木屑雞糞3000) 尿素：430~540 過磷酸鈣：500~830 氯化鉀：200~300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、 尿素、氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次施用。