

北部地區蔬菜

種類	主要病害及防治藥劑	主要蟲害及防治藥劑
芥藍	苗立枯病—35伊得利可濕性粉劑，播種同時施藥。 25%伊得利乳劑，播種同時施藥。 露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 72%鋅鋁克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。 黑斑病—21.2%依滅列乳劑，採收前6天停止施藥。 75%四氯異苯腈可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。	夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，採收前9天停止施藥。 10%芬普寧乳劑，採收前12天停止施藥。 蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，芥藍採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 紋白蝶—3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。
芹菜	嵌紋病—以有機磷劑防除蚜蟲，或拔除病株並燒燬。 菌核病—尚無推薦藥劑。	蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停用。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 切根蟲—8%托美松粒劑，限種植前使用。 22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。
花椰菜	露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 72%鋅鋁克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。 軟腐病—12.5%鏈黴素或68%多保鏈黴素於花初形成時施藥，採收前14天停止施藥。 細菌黑腐病—以1%醋酸鋅於35℃之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。 煤煙病—以殺蟲劑防除蚜蟲。 缺硼症—施用硼砂，每公頃2公斤，絕不可增量，否則會導致葉片焦枯。	蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停用。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 紋白蝶—3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。 菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 擬尺蠖—5%芬化利乳劑，採收前10天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。
番茄	果頂腐爛病—整地時即須施用含鈣較高之肥料，避免酸（缺鈣）性肥料及減少不必要之生長素，並須疏果。 裂果症—整地時即須施用硼砂，每公頃2公斤，不可多施，（缺硼）亦須避免不必要之生長素，並須疏果。 青枯病—整地時即須施用SH土壤添加物，每分地120~150公斤，並栽植抗或耐病品種。 凋萎病—整地時即須施用SH土壤添加物，每分地120~150公斤，並栽植抗或耐病品種。 晚疫病—80%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停用。 葉斑病—尚無推薦藥劑。 白粉病—尚無推薦藥劑。 毒素病—拔除病株燒燬。	根瘤綠蟲—定植前以芬滅松粒劑、歐殺滅粒劑或滅綠蟲粒劑施於植床，定植後不可再施藥。 番茄夜蛾—5%克福隆乳劑，採收前15天停止用藥。 （玉米穗蟲）40%大福賽寧可濕性粉劑，採收前6天停止用藥。 75%硫敵克可濕性粉劑，採收前3天停止用藥。 茄螟—85%加保扶可濕性粉劑，採收前18天停止施藥。

病害：葉俊熾 聯合執筆
虫害：李聯興

種類	主要病害及防治藥劑	主要蟲害及防治藥劑
胡瓜	露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑，採收前7天停用。 白粉病—5%菲克利水懸劑，採收前14天停止施藥。 12%邁克尼乳劑，採收前3天停止施藥。 5%三泰芬可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 毒素病—拔除病株並燒燬，並防除蚜蟲。	黃守瓜—50%加保利可濕性粉劑，瓜類發芽後，成蟲發生時施藥，採收前7天停止施藥。 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 瓜實蠅—25%馬拉松可濕性粉劑，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。
菜豆(四季豆)	銹病—30%三得寧乳劑，採收前6天停止施藥。 33%鋅錳乃浦水懸劑，採收前12天停止施藥。 炭疽病—尚無推薦藥劑。	豆潛蠅—40.6%加保扶水懸液於發芽開始施藥，二次間隔一星期。 紅蜘蛛—2.8%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 10%合賽多粒劑可濕性粉劑，採收前20天停用。 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。
蘿蔔	黑腐病—以1%醋酸鋅於35—40℃浸種，再以冷開水洗浸後播種。 毒素病—拔除病株並燒燬，並防除蚜蟲。	蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。 50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。
甘藍	苗立枯病—播種後立即施用35%或25%伊得利稀釋液。 露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。 黑腐病—以1%醋酸鋅於35℃之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。 軟腐病—12.5%鍊黴素或68%多保鍊黴素於開始結球時施藥，採收前14天停止施藥。	小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天，小葉菜類採收前9天停止施藥。 10%芬普寧乳劑，採收前9天停止施藥。 蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。 切根蟲—8%托美松粒劑，限種植前使用。 22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 紋白蝶—3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 5%賽滅寧乳劑，採收前6天停止施藥。

種類	主要病害及防治藥劑	主要蟲害及防治藥劑
白菜	露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。 軟腐病—尚無推薦藥劑。 黑斑病—21.2%依滅列乳劑，採收前6天停止施藥。 75%四氯異苯腈可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。	蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施藥。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 可懸掛性費洛蒙誘殺器誘集雄蟲，降低害蟲族群密度。 黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。 50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。
萵苣	立枯病—播種後立即施用伊得利稀釋液。 菌核病—50%免克寧可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。 50%大克爛可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。 50%撲滅寧可濕性粉劑，採收前12天停止施藥。 露菌病—85%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。	蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。 切根蟲—8%托美松粒劑，限種植前使用。 22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。
芥菜	幼苗立枯病—35%伊得利可濕性粉劑，播種同時施藥。 25%伊得利乳劑，播種同時施藥。 露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。 萎黃病—整地時施用SH添加物，每分地120—150公斤。 軟腐病—12.5%鏈黴素或68%多保鏈黴素於花初形成時施藥，採收前14天停止施藥。 黑腐病—以1%醋酸鋅於35—40℃浸種，再以冷開水洗浸後播種。	小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天，小葉菜類採收前9天停止施藥。 10%芬普寧乳劑，採收前12天停止施藥。 蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。 黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。 50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施藥。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前10天停止施藥。
蕹菜	白銹病—尚無推薦藥劑	龜葉金花蟲—50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 斜紋夜盜—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。
莧菜	白銹病—尚無推薦藥劑。	紅蜘蛛—25.1%畢芬寧乳劑，採收前6天停止施藥。
結球白菜	黑腐病—以1%醋酸鋅於35℃之溫度浸種10分鐘後，用冷開水洗浸再播種。 軟腐病—12.5%鏈黴素或68%多保鏈黴素於開始結球時施藥，採收前14天停止施藥。 露菌病—65%鋅乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 80%錳乃浦可濕性粉劑，採收前3天停止施藥。 72%鋅錳克絕可濕性粉劑，採收前21天停止施藥。	夜盜蟲—25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 10%百滅寧乳劑，每隔7天施藥一次。 25%二福隆可濕性粉劑，採收前22天停止施藥。 蚜蟲—10%畢芬寧可濕性粉劑，採收前6天停止施藥。 50%培丹水溶性粉劑，採收前7天停止施藥。 50%比加普可濕性粉劑，採收前15天停止施藥。 菜心螟—58%乃力松乳劑，採收前4天停止施藥。 3%蘇力菌可濕性粉劑，採收前亦可施用。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。 切根蟲—8%托美松粒劑，限種植前使用。 22.5%陶斯松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，定植前3天施藥一次。 小菜蛾—20%拜裕松乳劑，採收前10天停止施藥。 25%陶斯寧乳劑，包葉菜類採收前6天，小葉菜類採收前9天停止施藥。 10%芬普寧乳劑，包葉菜類採收前9天，小葉菜類採收前12天停止施藥。 蘇力菌水懸液，害蟲發生初期即行施藥連續兩次。 黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑，採收前4天停止施藥。 50%加保利可濕性粉劑，採收前7天停止施藥。 25.3%美文松乳劑，採收前3天停止施藥。