

北部地區果樹（柑桔、梨）

蟲害及防治方法

■ 李聯興

柑桔主要蟲害及防治方法

柑桔葉蟬：10%合賽多可濕性粉劑4000倍
(柑桔紅蜘蛛) 50%芬佈賜可濕性粉劑2000倍
20%得脫蟎可濕性粉劑1000倍
25%新殺蟎乳劑1000倍
46.5%愛殺松乳劑800倍
20%三亞蟎乳劑1000倍

於葉蟬發生時開始施藥，
每隔七天施藥一次，連


柑桔銹蟬：25%新殺蟎乳劑1000倍
50%芬佈賜水懸液2000倍
31.6%丁基加保扶乳劑1200倍
42%克芬水懸劑3000倍
50%佈嘉信乳劑1000倍

銹蟬發生初期開始施藥，
每隔三星期施藥一次。

柑桔角肩椿象：44%大滅松乳劑1000倍
85%加保利可濕性粉劑850倍

發現危害柑桔果實時開始施藥，
隔十天再施藥一次，共施二次。

柑桔星天牛：四至五月間成蟲出現前，將藥液40.64%加保扶水懸液100倍
噴灑於離地面45公分之樹幹基部，以防產卵，採收前10天停止施藥。



▲ 柑桔銹蟬為害



▲ 柑桔星天牛幼蟲

柑桔潛葉蛾：2.8%賽洛寧乳劑4000倍
50%益滅松可濕性粉劑500倍
30%福隆納乃得水懸劑1500倍
24%歐殺滅液劑750倍
2.8%畢芬寧乳劑1000倍

於新芽萌發時施藥一次，10天後再施藥一次。

柑桔木虱、刺粉蠹：50%馬拉松乳劑800倍
44%大滅松乳劑1000倍
47%得拉松乳劑1000倍
33%福木松乳劑500倍

蟲害發生時施藥一次。

柑桔蚜蟲類：20%免扶克乳劑800倍
50%福賜米松乳劑1000倍
25%滅賜松乳劑800倍
40%丁基加保扶可濕性粉劑1200倍
25%硫滅松乳劑 1000倍

於春、夏芽萌發時若發生蚜蟲類危害，每十日施藥一次，共施二次，採收前廿天停止施藥。

柑桔有殼介殼蟲類：31%丁基加保扶乳劑400倍
50%馬拉松乳劑800倍
44%大滅松1000倍

於蟲害發生時混合95%夏油乳劑95倍每隔七天施藥一次，連續二次。

柑桔無殼介殼蟲類：50%馬拉松乳劑1000倍
40%滅大松乳劑1000倍
44%大滅松乳劑1000倍

於蟲害發生時施藥一次。



▲柑桔潛葉蛾危害徵狀



▲柑桔桔蚜



▲柑桔褐圓介殼蟲

梨主要蟲害及防治方法

梨綠蚜蟲：2.8%賽洛寧乳劑2000倍

40.8%陶斯松乳劑2000倍

45%克硫松可濕性粉劑1000倍

30%裕必松可濕性粉劑1000倍

40.64%加保扶水懸劑1200倍

於蚜蟲發生時施藥一次，其後視情形
隔二星期後再施藥一次。

梨二點葉蟬：10%合賽多3000倍

25.1%畢芬寧乳劑5000倍

50%芬佈賜1500倍

20%三亞瑞乳劑1000倍

10%芬蟬寧乳劑1500倍

於葉蟬發生初期施藥一次，七至十天後
再施藥一次。

梨圓介殼蟲：40.64%加保扶水懸劑1000倍

40.8%陶斯松乳劑2000倍


於害蟲發生時每隔十天施藥一次，連續二次。



▲梨綠蚜



▲梨介殼蟲



▲二點葉蟬