

口紅花

陳永漢



一、概 說

口紅花爲苦苣苔科芒毛苣苔屬半蔓性的多年生植物，其莖可長達1公尺。口紅花的葉對生或3～4片葉輪生，葉肥厚肉質，卵形，表面濃綠富含光澤，全緣；花單生或叢生在葉腋，花梗短，萼筒長，花色鮮紅，形似「口紅」而得名。本省常見於6～7月夏季期間開花，但本省目前大都以溫度與挑選品種的方式將產期調整至農曆年前後，作爲一應節的垂吊性盆花銷售。

二、栽培品種

本省口紅花主要的栽培品種爲蒙娜麗莎(Mona Lisa)，主要作爲懸垂性吊盆用，但可藉由栽培管理方式栽種成直立性而作爲盆花銷售，另外1994年由穗耕種苗公司引進直立性口紅花，品種有卡妮娜(Carina)、魯賓士(Rubens)、麗格爾(Rigel)和紫星(Purple Star)，這些品種爲1993年在荷蘭花卉拍賣市場上首度推出的盆花系列，但這些品種目前在本省僅有少量栽植。

三、栽培管理

口紅花的繁殖以扦插法爲主，由於本省地處亞熱帶且目前的花卉生產場都已搭建設施，因此幾乎一年四季都可進行扦插；插穗選取健壯母株的莖段約10公分長，利用泥炭土、珍珠石、發泡煉石等排水良好的介質，直接扦插於15公分的吊盆，栽培介質中可以施用緩效性肥料如奧

妙肥或好康多作爲基肥，視植物生長情形施用液態肥料作爲追肥。

口紅花主要的病害是夏季的炭疽病，本病初期會在葉片表面上出現小如針尖般大小的斑點，然後逐漸擴大、顏色加深，最後形成黃褐色的圓形斑點，因此夏季期間應保持良好通風環境、降低設施內濕度並避免施用過量的氮肥，在藥劑的防治方面，可使用廣效性的殺菌劑如鋅錳乃浦加以防治。另外口紅花也會有頂端生長點壞死的現象，發生都集中在氣溫上升期，此時植物生長快速，頂端組織容易造成缺鈣而壞死，因此在氣溫回暖的季節應注意鈣元素的補充。

一般口紅花在17～21℃下進行花芽分化，此時若能維持高光強度並降低氮肥的供應，有促進花芽分化的效果，一旦花芽分化完成，於較強的光度下栽培則開花的速度就越快。

四、產業概況

本省口紅花的生產集中在宜蘭與屏東地區，年產量約有十萬盆左右。宜蘭地區因爲冬季溫度較低，花期較早，約在10～11月就有花苞，而屏東地區因爲冬季溫度較高，產期較宜蘭爲晚。其他如埔里地區也有少量的栽植，主要供應中部地區，但因爲產期長加上夏季炭疽病危害等因素影響，產量有逐年降低的趨勢。