

蔬菜病害防治曆

作物	主要病害	藥劑	施藥倍數(倍)	安全採收(天)
蔬菜	白粉病	80%福賽得水分散性粒劑	500	12
蔥	鏽病	50%三氟敏水分散性粒劑	4,000	12
		23%三素隆水分散性粒劑	2,000	15
		23%亞托敏水懸劑	3,000	10
	葉斑病	44.2%克收欣水懸劑	2,500	10
		50%依普司可濕性粉劑	1,000	6
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	12
	白網病	50%大克爾可濕性粉劑	2,000	12
		50%福多寧可濕性粉劑	3,000	18
洋香瓜	苗立枯病	80%殺紋寧溶液	1,000	
	白粉病	40%克熱淨可濕性粉劑	1,500	6
		10%平克座水基乳劑	7,500	6
		21.2%依滅列乳劑	2,000	3
	蔓枯病	23%亞托敏水懸劑	4,000	6
		37%豐砂得乳劑	10,000	6
		24.9%特克利乳劑	3,000	6
		28.6%百克敏乳劑	3,000	12
	黑腐病	9.4%賽座滅水懸劑	3,000	6
		80%免得爛水分散性粒劑	500	6
胡瓜	苗立枯病	80%殺紋寧溶液	1,000	
	黑腐病	75%鉍錳座賽脫水分散性粒劑	1,000	3
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
		64%甲鉍敏殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%鉍錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	99%礦物油乳劑	500	
		10.5%平克座乳劑	3,000	3
		13.4%邁克尼乳劑	4,000	3
	疫病	25%依得利乳劑	1,500	6
		35%依得利可濕性粉劑	2,000	6
		50%達滅芬可濕性粉劑	3,000	6
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
	細菌性斑點病	40%網快得寧混合可濕性粉劑	500	3
番茄	苗立枯病	5%本達樂粒劑	0.02 公克/穴	
	晚疫病	9.4%賽座滅水懸劑	3,000	6
		80%免得爛可濕性粉劑	500	7
		50%達滅芬可濕性粉劑	4,000	6
		52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	2,500	6

作物	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
番茄	早疫病	58%松香銅乳劑	1,500	
		77%氫氧化銅可濕性粉劑	800	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	3
	葉斑病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7
		80%錳錳乃浦可濕性粉劑	500	7
	幼苗疫病	25%依得利乳劑	1,500	限苗期使用
		35%依得利可濕性粉劑	3,000	限苗期使用
	白粉病	50%福多寧可濕性粉劑	5,000	
	細菌性斑點病	53.8%氫氧化銅水分散性粒劑	2,000	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	6
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	3
	炭疽病	22.7%膾硫膠水懸劑	700	4
南瓜	霜霉病	23.7%依替同水懸劑	1,000	6
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	6
		55%膾硫膠銅可濕性粉劑	500	7
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
	白粉病	64%甲拌磷殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%錳錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
		11.76%芬瑞其乳劑	10,000	3
		18.4%邁克尼乳劑	4,000	3
	炭疽病	5%三泰芬可濕性粉劑	2,000	6
		70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
菜豆 (蠶豆)	白粉病	50%枯草桿菌可濕性粉劑	800	
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	3
		10.5%平克座乳劑	4,000	6
	疫病	33%錳錳乃浦水懸劑	400	12
	角斑病	24.6%特克利乳劑	3,000	3
蘆竹筍	炭紋病	砍除罹病株並更新無病毒綠竹苗		
甜椒	疫病	5%本達樂粒劑	0.02 公克/穴	
		25%依得利乳劑	2,500	20
		35%依得利可濕性粉劑	2,000	20
	細菌性斑點病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	3
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	3
	炭疽病	22.7%膾硫膠水懸劑	700	4
	灰黴病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	6
西瓜	苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1,000	
	白粉病	5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	6
		30%白粉松乳劑	2,000	3

作物	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全采收(天)
西瓜	白粉病	11.76%芬瑞莫乳劑	4,000	3
	蔓枯病	74%貝芬錳可濕性粉劑	400	6
	蔓枯病	23%亞托敏水懸劑	4,000	6
		21.2%依滅列乳劑	2,000	3
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	15
	炭疽病	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	3
		60%銅合腐絕可濕性粉劑	500	3
		37%銅本達樂可濕性粉劑	600	6
		93%克絕波爾多可濕性粉劑	600	3
	炭疽病	25%撲克拉水基乳劑	3,000	6
		24.9%特克利乳劑	3,000	9
		75%四氯異苯肼可濕性粉劑	600	14
	根腐線蟲	75%福賽絕乳劑	600-1,000	限種植當日施藥
		10%芬滅松粒劑	15 公斤/公頃	限種植當日施藥
		10%托福松粒劑	15 公斤/公頃	限種植當日施藥
鳳梨	炭疽病	55%腈硫靈銅可濕性粉劑	500	7
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
		64%甲拌磷殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%鉍錫滅速樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	11.76%芬瑞莫乳劑	10,000	3
		13.4%邁克尼乳劑	4,000	3
		5%三泰芬可濕性粉劑	2,000	6
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
苦瓜	苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1,000	
	炭疽病	55%腈硫靈銅可濕性粉劑	500	7
		64%甲拌磷殺斯可濕性粉劑	400	6
		80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7
		75%免得克絕可濕性粉劑	750	3
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
萬壽	苗立枯病	50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	炭疽病	23%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	6
		75%四氯異苯肼可濕性粉劑	700	7
		50%依昔同可濕性粉劑	1,000	6
	葉枯病 (葉斑病)	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
		23%三泰隆水分散性粒劑	2,000	15
	炭疽病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7

作物	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
莧菜	菌核病	50%大克爾可濕性粉劑	2,000	7
		50%貝芬同可濕性粉劑	1,000	6
白菜	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
		50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	霜霉病	71.6%銅右滅速樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		28%亞托敏水懸劑	2,000	15
	黑斑病	75%四氫異苯吡可濕性粉劑	700	7
		21.2%依滅列乳劑	1,500	6
莴苣	白銹病	33.5%快得寧水懸劑	1,500	15
		80%福賽得水分散性粒劑	500	12
		64%甲鋅敵殺斯可濕性粉劑	400	15
甘藍	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
	霜霉病	71.6%銅右滅速樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		28%亞托敏水懸劑	2,000	15
	黑斑病	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1,000	
		21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	黑腐病	10%維利黴素溶液	600	6
		81.3%嘉爾銅可濕性粉劑	1,000	6
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
	根腐病	0.8%無硫滅粉劑	每公頃每次施藥量 200 公斤	
芥藍	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
	霜霉病	28%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香肅銅乳劑	1,000	
	黑斑病	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1,000	
		21.2%依滅列乳劑	1,500	12
結球白菜	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
	霜霉病	71.6%銅右滅速樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		28%亞托敏水懸劑	2,000	15
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	軟腐病	68.8%多保黴素可濕性粉劑	1,000	12
		12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7

作物	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
綠豆 (紅豆)	根腐病	0.3%氯硫滅粉劑	每公頃每次施藥量 200 公斤	
	白粉病	24.9%特克利乳劑	3,000	3
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	3
		10.5%平克座乳劑	4,000	6
	炭疽病	33%鉍錫乃浦水懸劑	400	12
	煤黴病	24.9%特克利乳劑	3,000	3
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	3
花椰菜	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
	黑腐病	71.6%網右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
蘿蔔	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
	黑腐病	71.6%網右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克鋅可濕性粉劑	750	15
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
胡蘿蔔	白粉病	50%克收欣水分散性粒劑	3,000	3
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	12
		18.8%寶福寧乳劑	1,000	21
	根腐線蟲	10%芬滅松粒劑	20-40 公斤/公頃	限播種前使用
		5%丁基加保扶粒劑	70 公斤/公頃	限播種前使用
		3%加保扶粒劑	100 公斤/公頃	限播種前使用
芹菜	黃萎病	98%邁隆粒劑	60 公克/平方公尺	限苗圃使用
	葉枯病	47%氧化亞銅水懸劑	800	7
	菌核病	50%大克爾可濕性粉劑	2,000	7
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
		50%貝芬同可濕性粉劑	1,000	6
青花菜	苗立枯病	23.2%寶克隆水懸劑	1,000	15
	黑腐病	71.6%網右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7

作物	主要病害	藥劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
茼蒿	立枯病	50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	葉枯病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
		23%三嗪隆水分散性粒劑	2,000	15
	霜霉病	23%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香鹼銅乳劑	1,000	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
		50%大克爾可濕性粉劑	2,000	7
		50%貝芬同可濕性粉劑	1,000	8
菠菜	苗立枯病	75%滅普寧可濕性粉劑	1,500	限苗床使用
		75%滅普寧可濕性粉劑	2 公克/公斤種子	限拌種使用
		50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	霜霉病	70%鉍錳賽得可濕性粉劑	600	18
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香鹼銅乳劑	1,000	
芥菜	苗立枯病	23.2%賽克隆水懸劑	1,000	15
	霜霉病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	8
		48%松香鹼銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		18.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
蘿	葉斑病	24.9%特克利乳劑	8,000	21
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	800	8
絲瓜	霜霉病	55%腈菌靈銅可濕性粉劑	500	7
		23%亞托敏水懸劑	2,000	8
		64%甲銻歐殺斯可濕性粉劑	400	8
		58%鉍錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	11.76%芬瑞莫乳劑	10,000	8
		18.4%邁克尼乳劑	4,000	8
		5%三嗪芬可濕性粉劑	2,000	8
	疫病	25%依得利乳劑	1,500	8
		35%依得利可濕性粉劑	2,000	8
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
	細菌性斑點病	40%銅快得寧混合可濕性粉劑	500	8



蓮藕病



十字花科根腐病



瓜苗立枯病



十字花科黑斑病



甘藍黑腐病



甘藍薹芽病



茄疫病



番茄青枯病



甘藍黑腐病



長豇豆煤霉病



番茄細菌性斑點病



番茄黃化捲葉病毒



胡瓜白粉病



甜椒炭疽病-葉



番茄疫病



番茄葉捲病



莧菜白銹病



番茄早疫病



葉菜甘藷白銹病



高麗菜凋萎病