

臺灣常見蔬菜栽培方法

紅甘藍 Red cabbage

科名：十字花科

別名：紅色高麗菜、紅玻璃菜、紫甘藍、紫色高麗菜



生育環境條件：性喜冷涼氣候，栽培適溫為18~21°C，適合秋冬栽培，日照充足為宜，土壤pH值5.0~6.5，土層深厚，排水佳之砂壤土至黏壤土最適宜。

栽培方法：以穴盤育苗，幼苗本葉4~6片時，移植至田間，行株距45×35公分。

甘藍 Cabbage

科名：十字花科

別名：高麗菜、玻璃菜



生育環境條件：性喜冷涼，生育適溫為20°C左右，30°C以上高溫其生育趨衰弱，15°C以下則結球速度緩慢，砂質土到黏質壤土皆可適合栽培，pH值5.5~6.5為宜，過酸土壤不僅生育受阻，鎂和磷之吸收也受妨礙，且易引起根瘤病，可以施用有機質堆肥，改善之。

栽培方法：以穴盤育苗，幼苗本葉3~6片時，移植至田間，行株距為60×40公分，栽培品種有：初秋甘藍、高峰、春秋一號、春秋二號、夏峰、夏秋、夏寶、早秋、長岡交配60日甘藍及夏強甘藍。

臺灣常見蔬菜栽培方法

芥藍 Chinese kale

科名：十字花科

別名：芥蘭菜、格蘭菜



生育環境條件：性喜冷涼，依品種不同，適應性不同，黃花品種較不耐熱，白花品種較耐熱。土壤以壤土，pH值5.5~6.8為適。

栽培方法：撒播及穴盤育苗移植為主，撒播者為整株採收，食用部位為幼株；育苗移植者以採收嫩梢為主。行株距為20~30公分。

球莖甘藍 Kobilrabi

科名：十字花科

別名：結頭菜、大頭菜



生育環境條件：性喜冷涼，日照充足，不耐熱，能抵抗霜害。種子發芽適溫為15~28°C，生育與結球適溫為15~20°C，土壤條件以有機質壤土，pH值5.5~6.5為適。

栽培方法：撒播或育苗移植，行株距為40×30（公分）。栽培品種有北京晚生種、白蕪牛生及紫蕪等。

彩葉甘藍 Cabbage kale

科名：十字花科

別名：葉牡丹、雨衣甘藍、彩葉高麗菜



生育環境條件：性喜冷涼，生育適溫15~20°C。

栽培方法：穴盤育苗至4~5片本葉時，移植至栽培圃，或種在花盆中供觀賞。顏色有紅、黃、紫及綠等多種。