

甜椒 Sweet pepper

科名：茄科

別名：番椒、大同、青椒



生育環境條件：性喜溫暖乾燥氣候，種子發芽適溫為25～30℃，生育適溫為20～25℃左右。土壤pH值5.5～6.7為宜。

栽培方法：穴盤育苗至4～5片本葉時，移植至田間，行株距為60×45公分。栽培品種有藍星、女王星、銘星及巨鐘。

菠菜 Spinach

科名：藜科

別名：菠薐菜、赤根菜



生育環境條件：性喜冷涼，生育適溫為15～20℃左右，菠菜屬長日性作物。土壤pH值6.0～7.0為宜，pH5.5以下強酸性土壤發芽差。

栽培方法：條播或撒播為主，種子播後行適當覆土，催芽播種者避免土壤乾燥，先行灌水後播種為好。

台灣人參 Coral flower

科名：馬齒莧科

別名：假人參、土人參



生育環境條件：全年四季均有生長，土壤以表土深厚肥沃，腐植質黏土或壤土為宜。

栽培方法：穴盤育苗至本葉4～5片，移植至田間，行株距40×20公分，栽培品種有美國參及墨西哥參。

藤三七 Madeira-vine

科名：落葵科

別名：田三七



生育環境條件：生育適溫為20～30℃，食用部位為嫩葉。

栽培方法：繁殖方法以珠芽繁殖，或扦插育苗，定植之後需立支柱。

九層塔 Basil

科名：唇形化科

別名：九層塔、零陸水菜



生育環境條件：性喜溫暖，生育適溫20～30℃，土壤適應性廣，以富有機質腐植壤土為佳。

栽培方法：穴盤育苗，幼苗本葉4～5片時，移植於田間，行株距40×60公分，栽培品種有：青梗種、紅梗種、大葉種及矮化維勒等。

葉用甘藷 Sweet potato

科名：旋花科

別名：番藷葉、地瓜葉



生育環境條件：生育適溫為20～35℃，日照充分，土壤pH值5.2～6.7為適。

栽培方法：扦插繁殖為主，食用部位為新梢或嫩葉。