

十字花科、菊科、旋花科及莧科跨科別蟲害安全用藥三維表

製表日期 2017.6.8

本清單表列藥劑推薦使用範圍皆包括十字花科、菊科、旋花科及莧科四科作物。

作用 機制	藥劑 名稱	安全 採收 期	系 統 性	蔬菜						
				蔬 菜	包 葉 菜 類	小 葉 菜 類	十 字 花 科 ¹	菊 科 ²	旋 花 科	莧 科
1A	加保利	7	●	鞘			鱗 鞘			
1A	納乃得	4-6 ³	●	鱗			蚜 鞘	蚜 薊馬	蚜 鞘	鱗 蚜
1A	硫敵克	3-6	●	鱗			鱗	鱗	鱗 鞘	鱗
1A+ 3A	納得亞 滅寧	6	●	鱗						
1B	乃力松	4		鱗			鱗 蚜	鱗	鱗	鱗
1B	佈飛松	10-12	◎	潛蠅			鱗 鞘	薊馬	鞘	
1B	馬拉松	4-7		鱗			鱗 蚜 鞘	鱗	鱗	
1B	撲滅松	10		青椿象						
1B+ 3A	益滅賽 寧	6-15		鱗			鱗			
3A	芬化利	7-14			鱗	鱗	鱗 鞘	鱗	鱗 鞘	鱗
3A	畢芬寧	9			鱗 蝨	鱗 蝨	鱗			
3A	第滅寧	6-20		鱗 薊馬	蚜 潛蠅	蚜 潛蠅	鱗 蚜	蚜	蚜	蚜
3A	賽洛寧	6-14		鱗	鱗	鱗	鱗	鱗 薊馬	鱗 鞘 蟎	蟎
3A	賽滅寧	6					鱗	鱗 薊馬	鱗	鱗
3A	護賽寧	15			蚜	蚜	鱗 蚜	蚜	蚜	
4A	亞滅培	6-12	●				蚜 蝨 鞘	蚜 蝨 薊馬	蚜 蝨 鞘	蚜
4A	益達胺	6-9	●		蚜 蝨	蚜 蝨	蚜	蚜 薊馬	蚜	
4A	達特南	3-7	●				蚜 蝨 鞘	蚜 蝨	蚜 蝨 鞘	蚜
4A	賽速安	6-12	●				蚜	蚜	蚜	蚜

¹十字花科包含十字花科包葉菜類及小葉菜類。

²菊科包含菊科包葉菜類及小葉菜類。

³艾草使用可芬諾或納乃得安全採收期為 21 天。

作用 機制	藥劑 名稱	安全 採收 期	系 統 性	蔬菜類						
				蔬菜	包葉 菜類	小葉 菜類	十字 花科	菊科	旋花科	莧科
6	因滅汀	3-18					(鱗) 鞘	(鱗)	(鱗)	(鱗)
6	阿巴汀	6-15	◎	潛蠅		蟲 潛蠅	(鱗) 鞘			
6	密滅汀	6	◎				蚱	蚱 蟎	蚱 蟎	蟎
14	培丹	6-14	●		蚱 蟲	蚱 蟲	(鱗) 蚱 鞘	(鱗) 蚱	(鱗) 鞘 蚱	(鱗)
15	二福隆	14-23			(鱗)		(鱗) 鞘	(鱗) 鞘	(鱗) 鞘	(鱗) 鞘
15	克福隆	6-15		(鱗)		(鱗)	(鱗)			
17	賽滅淨	7	●		潛蠅	潛蠅	潛蠅	潛蠅	潛蠅	潛蠅
18	可芬諾	14 ⁴					(鱗) 鞘	(鱗)	鞘	(鱗)
28	剋安勃	6-12	○				(鱗)	(鱗)	(鱗)	(鱗)
11A	蘇力菌	-			(鱗)	(鱗)	(鱗)			
	苦參鹼	-		(鱗) 蚱						

作物類別		作物品項
包葉 菜類	十字花科	甘藍、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、球莖甘藍、抱子甘藍
	菊科	結球萵苣及朝鮮薊
小葉 菜類	十字花科	小白菜、油菜、青江菜、芥藍、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、廣島野菜、西洋菜
	菊科	不結球萵苣與半結球萵苣、茼蒿、山茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、芳香萬壽菊、闊包菊、艾草
	旋花科	蘿菜(空心菜)或葉用甘藷
	莧科	莧菜

●系統性：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其它植物組織。

◎局部系統性：又可指跨薄壁組織的作用，藥劑噴灑到植物的組織後，能短距離移動到周圍組織，如葉的上表皮到下表皮。

○選擇系統性：系統性僅出現在特定植物上或出現在施用的不同部位。

各目標害物標示註釋如下

(鱗)：推薦使用於鱗翅目害蟲、夜蛾類、毒蛾類、天蛾類、鳥羽蛾類、螟蛾類、菜心螟、大菜螟、小菜蛾、切根蟲、紋白蝶或擬尺蠖

蚱：蚱蟲類或偽菜蚱

蟲：推薦使用於粉蟲類或銀葉粉蟲

薊馬：推薦使用於薊馬類、葉部薊馬類或南黃薊馬

鞘：推薦使用於象鼻蟲類、金花蟲類、植食性瓢蟲類、黃條葉蚤或黃守瓜

⁴ 艾草使用可芬諾或納乃得安全採收期為 21 天。

蟎：推薦使用於葉蟎類

潛蠅：推薦使用於潛蠅類、斑潛蠅類或番茄斑潛蠅

十字花科、菊科、旋花科及莧科跨科別病害安全用藥三維表

製表日期 2017.6.8

本清單表列藥劑推薦使用範圍皆包括十字花科、菊科、旋花科及莧科四科作物。

作用 機制	藥劑 名稱	安全 採收 期	系 統 性	保 護 性	治 療 性	除 滅 性							
							蔬 菜	包葉 菜類	小葉 菜類	十字 花科	菊 科	旋花 科	莧 科
	綠木黴菌 R42	-					苗立枯病			苗立枯病			
	松香酯銅	-						露菌病	露菌病				
4	銅右滅達樂	3	●	V	V			露菌病		露菌病	露菌病	白銹病	白銹病
11	亞托敏	6-15	●	V	V	V			露菌病	露菌病 ⁵	露菌病 疫病 白銹病 ⁶	露菌病 白銹病	露菌病 白銹病 疫病
40	達滅芬	6-12	◎	V	V					露菌病 白銹病	露菌病 疫病 白銹病	白銹病	白銹病
43+28	氟比拔克	6-12	●	V						露菌病	露菌病 疫病	白銹病	白銹病
C3,11	百克敏	9-21	◎	V	V					炭疽病	炭疽病	炭疽病	炭疽病
M5	四氯異苯腈	7-21		V					葉斑病	黑斑病 炭疽病	炭疽病		
G1,3	依滅列	6-12	●	V	V			黑斑病	葉枯病 葉斑病	黑斑病			
E3,2	撲滅寧	3-7	●	V	V			菌核病	菌核病	菌核病 灰黴病			

保護性：藥劑在病原菌到達或開始感染前，在植物體表面或體內形成保護障蔽以避免感染發生，又可稱為預防性作用。

治療性：藥劑在植物組織中阻止病原菌在組織的早期生長，此類藥劑依藥劑種類不同，通常在感染發生後 24 至 72 小時最有效。要注意的是治療性藥劑在感染之前或感染初期都有效；但一旦到了較後期的感染，此類藥劑即無效果。

除滅性：作用方式同治療性藥劑，但可防除已出現病徵 (symptom) 的病原菌感染。

⁵亞托敏無十字花科小葉菜類露菌病使用方法，請依小葉菜類露菌病使用方法使用。

⁶亞托敏無菊科包葉菜類白銹病使用方法。

十字花科、菊科、繖形花科及藜科跨科別蟲害安全用藥三維表

製表日期 2017.6.8

本清單表列藥劑推薦使用範圍皆包括十字花科、菊科、繖形花科及藜科四科作物。

作用 機制	藥劑 名稱	安全 採收 期	系 統 性							
				蔬 菜	包 葉 菜 類	小 葉 菜 類	十 字 花 科 ⁷	菊 科 ⁸	繖 形 花 科	藜 科
1A	加保利	7	●	鞘			鞘 鱗			
1A	納乃得	4-6	●	鱗			鞘 蚜	蚜 薊馬	蚜	蚜
1A	硫敵克	3-14	●	鱗			鱗	鱗	鱗	鱗
1A+3A	納得亞滅寧	6	●	鱗						
1B	乃力松	4		鱗			鱗 蚜	鱗	鱗	鱗
1B	佈飛松	10-12	◎	潛蠅			鱗 鞘	薊馬		
1B	馬拉松	4-7		鱗			鱗 蚜 鞘	鱗	鱗	鱗
1B	撲滅松	10		青椿象						
1B+3A	益滅賽寧	6-15		鱗			鱗			
3A	芬化利	7-14			鱗	鱗	鱗 鞘	鱗	鱗	鱗
3A	畢芬寧	9			鱗 蟲	鱗 蟲	鱗			
3A	第滅寧	6-20		鱗 薊馬	蚜 潛蠅	蚜 潛蠅	鱗 蚜	蚜	蚜	蚜
3A	賽洛寧	6-14		鱗	鱗	鱗	鱗	鱗 薊馬	鱗	鱗
3A	賽滅寧	6					鱗	鱗 薊馬	鱗	鱗
3A	護賽寧	15			蚜	蚜	鱗 蚜	蚜	蚜	蚜
4A	益達胺	6-9	●		蟲 蚜	蟲 蚜	蚜	蚜 薊馬	蚜	蚜
6	因滅汀	3-18					鱗 鞘	鱗	鱗	鱗
6	阿巴汀	6-15	◎	潛蠅		蟲 潛蠅	鱗 鞘			
14	培丹	6-14	●		蟲 蚜	蟲 蚜	鱗 蚜 鞘	鱗 蚜	鱗 蚜	鱗 蚜
15	二福隆	14-23			鱗		鱗 鞘	鱗 鞘	鱗 鞘	鱗 鞘
15	克福隆	6-15		鱗		鱗	鱗			鱗
17	賽滅淨	7	●		潛蠅	潛蠅	潛蠅	潛蠅	潛蠅	潛蠅
11A	蘇力菌	0			鱗	鱗	鱗			鱗
	苦參鹼	-		蚜 鱗						

⁷十字花科包含十字花科包葉菜類及小葉菜類。

⁸菊科包含菊科包葉菜類及小葉菜類。

十字花科、菊科、繖形花科及藜科跨科別病害安全用藥三維表

本清單表列藥劑推薦使用範圍皆包括十字花科、菊科、繖形花科及藜科四科作物。

作用 機制	藥劑 名稱	安全 採收 期	系 統 性	保 護 性	治 療 性	除 滅 性							
							蔬 菜	包 葉 菜 類	小 葉 菜 類	十 字 花 科	菊 科	繖 形 花 科	藜 科
	綠木黴菌 R42	-					苗立枯病			苗立枯病			
	松香酯銅	-						露菌病	露菌病				
11	亞托敏	6-15	●	V	V	V			露菌病	露菌病 ⁹	露菌病 疫病 白銹病 ¹⁰	葉斑病	露菌病
M5	四氯異苯 腈	7-21		V					葉斑病	炭疽病 黑斑病	炭疽病		炭疽病
G1,3	依滅列	6-12	●	V	V			黑斑病	葉枯病 葉斑病	黑斑病			
E3,2	撲滅寧	3-7	●	V	V			菌核病	菌核病	灰黴病 菌核病			

作物類別		作物品項
包葉 菜類	十字花科	甘藍、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、球莖甘藍及抱子甘藍
	菊科	結球萵苣及朝鮮薊
小葉 菜類	十字花科	小白菜、油菜、青江菜、芥藍、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、廣島野菜及西洋菜
	菊科	不結球萵苣與半結球萵苣、茼蒿、山茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、芳香萬壽菊、闊包菊及艾草
	繖形花科	茴香、芹菜及芫荽
	藜科	菠菜

為精簡版面，各目標害物標示註釋如下

鱗：推薦使用於鱗翅目害蟲、夜蛾類、毒蛾類、天蛾類、鳥羽蛾類、螟蛾類、菜心螟、大菜螟、小菜蛾、切根蟲、紋白蝶或擬尺蠖

蚜：蚜蟲類或偽菜蚜

蝨：推薦使用於粉蝨類或銀葉粉蝨

薊馬：推薦使用於薊馬類、葉部薊馬類或南黃薊馬

鞘：推薦使用於金花蟲類、植食性瓢蟲類、黃條葉蚤或黃守瓜

潛蠅：推薦使用於潛蠅類、斑潛蠅類或番茄斑潛蠅

蟎：推薦使用於葉蟎類

⁹亞托敏無十字花科小葉菜類露菌病使用方法，請依小葉菜類露菌病使用方法使用。

¹⁰亞托敏無菊科包葉菜類白銹病使用方法。