

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

印楝素 乳劑 (EC) 4.5(%) (w/w)

作用機制：IRAC - un

對水中生物有劇毒性
禁止施用於水域
禁止大面積施藥
禁止空中施藥

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科包莖菜類	螟蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科包莖菜類	夜蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科包莖菜類	紋白蝶	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科包葉菜類	植食性瓢蟲類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
甘藍	小菜蛾	1公升	1000	害蟲發生時開始施藥	7		-				0851116	聯因股份有限公司
土字花科小葉菜類	螟蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科小葉菜類	夜蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科小葉菜類	紋白蝶	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科	植食性瓢	1公升	1,000	害蟲發生時開	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
小葉菜類	蟲類			始施藥								
土字花科根菜類	螟蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科根菜類	夜蛾類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科根菜類	紋白蝶	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
土字花科根菜類	植食性瓢蟲類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	1.試驗時加展著劑「不怕雨」(Bivert) 4,000 倍。	延伸使用	0980928	
花木	粉蟲類	0.6-1.2公升	1000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	-	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	延伸使用	1020909	
花木	銀葉粉蟲	0.6-1公升	1000	害蟲發生時開	7		-		限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。藥應噴到		0851116	聯因股份有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				始施藥					葉背。試驗時加展著劑(不怕雨)Bivert4000倍。			