

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

庫斯蘇力菌ABTS-351 粒劑 (GR) 2.3% (1,600 IU/mg)

作用機制：FRAC - BM02 、 IRAC - 11A

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
玉米	玉米螟	5公斤		輪生初、中期；雄花抽穗前；雌花吐絲後施藥。				將藥粒平均施於心葉。	輪生初、中期；雄花抽穗前4-5天；雌花吐絲後3-4天，各施藥一次。			

庫斯蘇力菌ABTS-351 水分散性粒劑 (WG) 54% (32,000 IU/mg)

作用機制：FRAC - BM02 、 IRAC - 11A

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
蔬菜	鱗翅目害蟲	0.5-0.75公斤	1500	害蟲發生時開始施藥。	7					延伸使用	1090611	
油茶	鱗翅目	0.5公斤	2000	害蟲發生時開	7					延伸使用	1090611	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
	害蟲			始施藥。								
土字花科包莖菜類	紋白蝶	0.5-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7		-	-	-		1011130	台灣住友化學股份有限公司
土字花科小莖菜類	紋白蝶	0.5-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7		-	-	-		1011130	台灣住友化學股份有限公司
土字花科根菜類	紋白蝶	0.5-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7		-	-	-		1011130	台灣住友化學股份有限公司
馬鈴薯	番茄潛旋蛾	0.6-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次				緊急防治用藥	1100120	
番茄	番茄潛旋蛾	0.3-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥	7	共2次				緊急防治用藥	1090717	
甜椒	番茄潛	0.6-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開	7	共2次				緊急防治	1100120	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
	旋蛾			始施藥。						用藥		
辣椒	番茄潛旋蛾	0.6-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次				緊急防治用藥	1100120	
茄子	番茄潛旋蛾	0.3-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥	7	共2次				緊急防治用藥	1090717	
山茶	鱗翅目害蟲	0.5公斤	2000	害蟲發生時開始施藥。	7					延伸使用	1090611	
茶	鱗翅目害蟲	0.5公斤	2000	害蟲發生時開始施藥。	7					延伸使用	1090611	

庫斯蘇力菌ABTS-351 可溼性粉劑 (WP) 23.7% (16,000 IU/mg)

作用機制：FRAC - BM02 、IRAC - 11A

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
玉米	玉米螟	1.6-2公斤	600	輪生期施藥。	-	-	-		雄花抽穗,吐絲初,吐絲後及全吐絲後5天各一次,展著劑YAMATO3,000倍。		0820310	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科包葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科包葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科包葉菜類	擬尺蠖	0.4-0.6公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科包葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科包葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科小葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科小葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科小葉菜類	擬尺蠖	0.4-0.6公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科小葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科小葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科根菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科根菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科根菜類	擬尺蠖	0.4-0.6公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科根菜類	小菜蛾	0.4-0.6公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科根菜類	紋白蝶	0.4-0.6公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
茶	茶蠶	0.5公斤	2,000		-	-	-		1.盡量在幼齡時期施藥。2.發生茶叢行局部施藥。			