

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

庫斯蘇力菌SA-12 可溼性粉劑 (WP) 70% (16,000 IU/mg)

作用機制：FRAC - BM02 、IRAC - 11A

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
玉米	玉米螟	1.6-2公斤	600	輪生期施藥。	-	-	-		雄花抽穗,吐絲初,吐絲後及全吐絲後5天各一次,展著劑YAMATO3,000倍。		0820310	
十字花科包葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
十字花科包葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
十字花科包葉	擬尺蠖	0.4-0.6公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菜類												
土字花科包莖菜類	小菜蛾	0.4-0.6公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科包莖菜類	紋白蝶	0.4-0.6公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科小葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科小葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科小葉	擬尺蠖	0.4-0.6公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菜類												
土字花科小葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科小葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字花科根菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科根菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	-	-					
土字花科根菜類	擬尺蠖	0.4-0.6公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
土字	小菜	0.4-0.6公	1,000	害蟲發生	7-10	-	-					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
茄科根菜類	蛾	斤		時開始施藥。								
土字花科根菜類	紋白蝶	0.4-0.6公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	-	-					
茶	茶蠶	0.5公斤	2,000		-	-	-		1.盡量在幼齡時期施藥。2.發生茶叢行局部施藥。			
檳榔	椰子綴蛾	0.5公斤	600	害蟲發生初期開始施藥。	14	2				延伸使用	1090611	