

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

斜紋夜蛾費洛蒙 蒸散劑 (VP) 5.5(%) (w/w)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
水稻	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
麥類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								45公尺。2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克	3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								膏劑)，但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
雜糧類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。 2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。 3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。 2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。 3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。 4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。 5. 開封前後均須冷藏(4℃)儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
乾豆類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量	器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
包莖菜類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4℃)儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
小葉菜類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。 3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續	劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。 5. 開封前後均須冷藏(4℃)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								2個月。				
根莖類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4℃)儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								色固定棒小孔的另一面觀察)。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔(即0.1公克膏劑)，但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
果菜類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								作物頂端上方約50公分處。 3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。	常現象，不影響藥效。 5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
瓜菜類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								面觀察)。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
豆菜類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。 2. 種植前1個月開始掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。 2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。 3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。 4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。 5. 開封前後	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								分處。 3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。	均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			
大豆	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並		1070328	中西化學工業股份

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥	避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4℃)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								方法， 總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
瓜果類	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
果樹	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。2. 請勿於同一誘蟲器中施用	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								器設置間距約45公尺。2. 種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小	2種以上費洛蒙產品。3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。5. 開封前後均須冷藏(4°C)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
茼蒿	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。 2. 種植前1個月開始掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。 3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。 2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。 3. 請至少每週清空或換新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。 4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。 5. 開封前後均須冷藏（4℃）儲存，使用後請將蓋子旋緊。	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				
特用	斜紋夜蛾							1. 每公頃設置7組中改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器，各誘蟲器設置間距約45公尺。 2.	1. 避免藥劑過量施用，以免降低誘引效果，並避免接觸到作物。 2. 請勿於同一誘蟲器中施用2種以上費洛蒙產品。 3. 請至少每週清空或換	延伸使用	1070907	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								種植前1個月開始施掛誘蟲器，設置高度離地面約0.8-1.5公尺，或作物頂端上方約50公分處。 3. 將膏劑蓋子轉開，管口輕觸於誘蟲器上蓋之黑色固定棒上的任一小孔，輕輕擠壓出膏劑直到注滿該小孔（可由該黑色固定棒小孔的另一面觀察）。依相同之施藥方法，總共填滿3個連續小孔（即0.1公克膏劑），	新誘蟲器下方之盛蟲容器，必要時可視誘得蟲數調整時間間隔。 4. 膏劑點於誘蟲器一天後會變成一層薄膜，此屬正常現象，不影響藥效。 5. 開封前後均須冷藏(4℃)儲存，使用後請將蓋子旋緊。			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								但須避免過量溢出。 4. 施用後藥效可持續2個月。				

斜紋夜蛾費洛蒙 蒸散劑 (VP) 91.2(%) (w/w)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
麥類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
雜糧類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
乾豆類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
包莖菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科包莖菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。		0850430	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
小葉菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科小葉菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。		0850430	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
根菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
土字花科根菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。		0850430	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
果菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
瓜菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
豆菜類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
瓜果類	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
果樹	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
花 木	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
特用	斜紋夜蛾							1.每公頃設置點數5至10個，每個點前後距離約50公尺、左右距離約20公尺。 2.誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。	1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.濕度低於攝氏15℃以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。	延伸使用	1120617	