

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證

無該劑型含量之許可證

甜菜夜蛾費洛蒙 蒸散劑 (VP) 80.2(%) (w/w)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                                   | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|-------|------|----------------------------------------|------|---------|----------|
| 麥類   | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 雜糧類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; |      | 0890629 |          |
| 雜糧類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 蔬菜   | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; |      | 0890629 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                                   | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|-------|------|----------------------------------------|------|---------|----------|
| 乾豆類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 包葉菜類 | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 小葉菜類 | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 根菜類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 果菜類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 瓜菜類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                                   | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|-------|------|----------------------------------------|------|---------|----------|
| 豆菜類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 瓜果類  | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 果樹   | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 花木   | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 特用   | 甜菜夜蛾 | 設置11-18個點 |      |      |      |      |       |      | 1.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內;2.誘蟲盒至少每週清1次; | 延伸使用 | 1071012 |          |

## 甜菜夜蛾費洛蒙 蒸散劑 (VP) 87.2(%) (w/w)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法                            | 注意事項                                                                                          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|---------|------|-----------------|------|------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| 麥類   | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可持續3個月。5. 每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 雜糧類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可持續3個月。5. 每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 雜糧類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置        | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可                         |      | 1070605 | 興農股份有限公司 |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法                            | 注意事項                                                                                         | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|---------|------|-----------------|------|------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
|      |      |         |      |                 |      |      |       | 間距約5公尺。                         | 持續3個月。<br>5.每條含有效成分0.24公克)。                                                                  |      |         |          |
| 蔬菜   | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。 |      | 1070605 | 興農股份有限公司 |
| 乾豆類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 包葉菜類 | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期    |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均                 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分                                                   | 延伸使用 | 1071012 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法                            | 注意事項                                                                                     | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|---------|------|-----------------|------|------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
|      |      |         |      | 使用。             |      |      |       | 勻分布於田間，設置間距約5公尺。                | 地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。                                        |      |         |          |
| 小葉菜類 | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1.具交配干擾功能。2.不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3.田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 根菜類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1.具交配干擾功能。2.不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3.田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 果菜   | 甜菜   | 500條    |      | 甜菜夜蛾            |      |      |       | 設置高度                            | 1.具交配干擾功能。2.                                                                             | 延伸   | 1071012 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法                            | 注意事項                                                                                     | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|---------|------|-----------------|------|------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| 類    | 夜蛾   |         |      | 發生前至發生初期使用。     |      |      |       | 離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。     | 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3.田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。             | 使用   |         |          |
| 瓜菜類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1.具交配干擾功能。2.不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3.田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 豆菜類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距      | 1.具交配干擾功能。2.不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3.田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效           | 延伸使用 | 1071012 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法                            | 注意事項                                                                                          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|---------|------|-----------------|------|------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
|      |      |         |      |                 |      |      |       | 約5公尺。                           | 成分0.24公克)。                                                                                    |      |         |          |
| 瓜果類  | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可持續3個月。5. 每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 果樹   | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4. 施用後藥效可持續3個月。5. 每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |
| 花木   | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於             | 1. 具交配干擾功能。2. 不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3. 田區面積1分地以上適用，大面積                                           | 延伸使用 | 1071012 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法                            | 注意事項                                                                                     | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|---------|------|-----------------|------|------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
|      |      |         |      |                 |      |      |       | 田間，設置間距約5公尺。                    | 共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。                                                 |      |         |          |
| 特用   | 甜菜夜蛾 | 500條    |      | 甜菜夜蛾發生前至發生初期使用。 |      |      |       | 設置高度離地面約60公分，並均勻分布於田間，設置間距約5公尺。 | 1.具交配干擾功能。2.不用時須以鋁箔紙密封，儲放於冷凍庫內。3.田區面積1分地以上適用，大面積共同防治效果更佳。4.施用後藥效可持續3個月。5.每條含有效成分0.24公克)。 | 延伸使用 | 1071012 |          |