

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

蓋棘木黴菌ICC080/012 可溼性粉劑 (WP) 1X10^7 CFU/g

作用機制：FRAC - BM2/BM2

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菊科包葉菜類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								倍，每株澆灌200毫升。				
小莖菜類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1110831	
菊科根	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1				使用前24-36小時，	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菜類				次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。			
茄科根菜類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
馬鈴薯	晚疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1110831	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
蔥科根菜類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								200毫升。				
甜菜	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	
薑	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天				使用前24-36小時，先將本藥劑與	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				再澆灌全株1次，共2次。				水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	畢，避免與殺菌劑混合使用。			
芋	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
茄科果菜類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
甜椒	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。		1040330	易利特開發有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
金針	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	
瓜菜類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				次，共2次。				合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	混合使用。			
瓜果類	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
草莓	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								倍，每株澆灌200毫升。				
花本	幼苗疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1110831	
黃耆	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1				使用前24-36小時，	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。	配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。			
薑	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
丹參	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。				
地黃	疫病	2.5公斤	2,000	定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。				使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌	避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。	延伸使用	1040330	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								200毫升。				