

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

液化澱粉芽孢桿菌CL3 水懸劑 (SC) 1×10^8 CFU/mL 以上

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
蔬菜	灰黴病	0.6-7.5公升	400	病害發生初期時開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1070222	
草莓	灰黴病	2.5公升	400	病害發生初期時開始施藥。	7	連續3次					1070222	興農股份有限公司
葡萄	灰黴病	2-3.2公升	500	病害發生初期或由花期開始至果實轉色期間使用。	7	連續3-6次					1120807	興農股份有限公司
花木	灰黴病	0.6-7.5公升	400	病害發生初期時開	7	連續3次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行	延伸使用	1070222	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				始施藥。					小面積藥害測試。			
菊	花枯病	0.6-7.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				緊急防治用藥	1100623	