

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

液化澱粉芽孢桿菌Tcba05 水懸劑 (SC) 1x10^9 CFU/mL

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
豆科乾豆類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
向日葵	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
包莖	萎凋	36.3公升	250	種子直播	7	共8次		以每株250	應避免與銅劑或抗生素	延伸	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菜類	病			或幼苗定植後10-14天開始施用。				毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	成分之殺菌劑混合使用。	使用		
小葉菜類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
根菜類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
果菜類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				始施用。				莖基部或根圈進行土壤澆灌。				
瓜菜類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
豆菜類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
菜豆	萎凋病	36.3公升	250	菜豆種子直播或定植後，待長出第3~4片葉子	7	共8次			應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。		1090504	福壽實業股份有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				完全展開後，開始進行施用。								
瓜果類	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
草莓	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
花木	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。適用於觀賞花卉。	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								土壤澆灌。				
莖	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
風茹	萎凋病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
百慕達草	黃葉病	36.3公升	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
豆科乾豆類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
向日葵	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
包莖菜類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
小葉菜類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
根菜類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
果菜類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
瓜菜類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植	7	共8次		以每株250毫升藥液	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				植後10-14天開始施用。				量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	劑混合使用。			
豆菜類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
菜豆	萎凋病	36.3公斤	250	菜豆種子直播或定植後，待長出第3~4片葉子完全展開後，開始進行施用。	7	共8次			應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。		1090504	福壽實業股份有限公司
瓜果類	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定	7	共8次		以每株250毫升藥液	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				植後10-14天開始施用。				量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	劑混合使用。			
草莓	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
花木	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。適用於觀賞花卉。	延伸使用	1111013	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菊	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
風茹	萎凋病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	
百慕達草	黃葉病	36.3公斤	250	種子直播或幼苗定植後10-14天開始施用。	7	共8次		以每株250毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。	應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	延伸使用	1111013	