

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證      無該劑型含量之許可證

液化澱粉芽孢桿菌YCMA1 可溼性粉劑 (WP) 5x10^9 CFU/g 以上

作用機制：FRAC - BM02

| 作物名稱  | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                 | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|-------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|----------------------|------|---------|----------|
| 豆科乾豆類 | 葉斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。        | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆科乾豆類 | 葉枯病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。        | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆科乾豆類 | 褐斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。        | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 油菜    | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。適用於油菜籽。 | 延伸使用 | 1070605 |          |

| 作物名稱     | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                  | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱     |
|----------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|-----------------------|------|---------|--------------|
| 向日葵      | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 十字花科包莖菜類 | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 甘藍       | 黑斑病  | 1.3-2.6公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         |      | 1070605 | 百泰生物科技股份有限公司 |
| 菊科包莖菜類   | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 豌豆       | 葉斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。適用於葉用豌豆。 | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 豌豆       | 葉枯病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。適用於葉用豌豆。 | 延伸使用 | 1070605 |              |

| 作物名稱     | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                  | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|----------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|-----------------------|------|---------|----------|
| 豌豆       | 褐斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。適用於葉用豌豆。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 十字花科小葉菜類 | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 菊科小葉菜類   | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 枸杞       | 早疫病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。適用於枸杞葉。  | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 枸杞       | 輪紋病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。適用於枸杞葉。  | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 蔥科小葉菜類   | 紫斑病  | 1.3-3.3公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。         | 延伸使用 | 1070605 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|---------------|------|---------|----------|
| 芹菜   | 黑葉枯病 | 0.4-5公斤   | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 芹菜   | 黑葉枯病 | 0.4-5公斤   | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 山蘇   | 葉斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆薯   | 葉斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆薯   | 葉枯病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆薯   | 褐斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 狗尾草  | 葉斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始    | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |

| 作物名稱    | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|---------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|---------------|------|---------|----------|
|         |      |           |      | 施藥。         |      |        |       |      |               |      |         |          |
| 狗尾草     | 葉枯病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 狗尾草     | 褐斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 闊葉大豆    | 葉斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 闊葉大豆    | 葉枯病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 闊葉大豆    | 褐斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 土字花科根菜類 | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |

| 作物名稱  | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|-------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|---------------|------|---------|----------|
| 菊科根菜類 | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 馬鈴薯   | 早疫病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 馬鈴薯   | 輪紋病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 蔥科根菜類 | 紫斑病  | 1.3-3.3公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 胡蘿蔔   | 黑葉枯病 | 0.4-5公斤   | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 茄科果菜類 | 早疫病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |

| 作物名稱  | 病蟲名稱   | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期            | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|-------|--------|-----------|------|-----------------|------|--------|-------|------|---------------|------|---------|----------|
| 茄科果菜類 | 輪紋病    | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。     | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆菜類   | 葉斑病    | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。     | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆菜類   | 葉枯病    | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。     | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 豆菜類   | 褐斑病    | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。     | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 檬果    | 細菌性黑斑病 | 1.5-3.3公斤 | 600  | 於檬果幼果期開始全株葉面噴施。 | 7    | 連續4次   |       |      |               | 延伸使用 | 1091231 |          |
| 桃     | 穿孔病    | 1.7-3.3公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。     | 7    | 連續4次   |       |      |               | 延伸使用 | 1091231 |          |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項                                 | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱     |
|------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|--------------------------------------|------|---------|--------------|
| 柑桔類  | 潰瘍病  | 1.3公斤     | 600  | 結果後開始施藥。    | 7    | 連續4次   |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。                        |      | 1080614 | 百泰生物科技股份有限公司 |
| 花木   | 葉斑病  | 1.0-4.2公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 花木   | 黑斑病  | 1.0-4.2公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 花木   | 褐斑病  | 1.0-4.2公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 菊    | 黑斑病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。                        | 延伸使用 | 1070605 |              |
| 菊    | 花枯病  | 0.4-1.7公斤 | 600  | 病害發生初期開始    | 7    | 連續3-4次 |       |      |                                      | 緊急防治 | 1100623 |              |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔 | 施用次數   | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項          | 說明   | 核准日期    | 原始登記廠商名稱 |
|------|------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|------|---------------|------|---------|----------|
|      |      |           |      | 施藥。         |      |        |       |      |               | 用藥   |         |          |
| 薑    | 葉斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 薑    | 葉枯病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 薑    | 褐斑病  | 0.8-2.5公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 薑    | 葉枯病  | 0.4-1.3公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 薑    | 黑葉枯病 | 0.4-5公斤   | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |
| 地薑   | 葉斑病  | 0.4-1.3公斤 | 600  | 病害發生初期開始施藥。 | 7    | 連續3-4次 |       |      | 藥液需均勻噴施於植株全株。 | 延伸使用 | 1070605 |          |