

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

枯草桿菌KHY8 水懸劑 (SC) 1×10^9 CFU/mL

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用 時期	施藥 間隔	施用 次數	安全 採收期	施藥 方法	注意事項	說明	核准 日期	原始 登記 廠商 名稱
果樹	炭疽病	0.54-6 公升	500	自開 花初 期開 始施 用， 每7-10 天使 用1 次， 至套 袋或 果實 採收 為 止。						延 伸 使 用	1110629	
葡萄	晚腐病	1.6- 3.2公 升	500	自開 花初 期開 始施 用， 每7-10 天使 用1 次， 至套 袋或 果實 採收						延 伸 使 用	1110629	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				為止。								
檬果	炭疽病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共10次			全株噴濕為準。		1090504	嘉農企業股份有限公司
檬果	炭疽病		50	果實包裝前浸泡於藥液約15秒後取出於通風處陰乾。							1091231	嘉農企業股份有限公司
檬果	細菌性黑斑病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共10次			全株噴濕為準。		1090504	嘉農企業股份有限公司
桃	穿孔病	2-4公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，						延伸使用	1110629	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用 時期	施藥 間隔	施用 次數	安全 採收期	施藥 方法	注意事項	說明	核准日期	原始 登記 廠商 名稱
				至套袋或果實採收為止。								
李	穿孔病	2-4公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						延伸使用	1110629	
柑桔類	潰瘍病	1.6-4.8公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						延伸使用	1110629	

枯草桿菌KHY8 可溼性粉劑 (WP) 1×10^9 CFU/g

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
水稻	稻熱病	3公斤	400	於稻作插秧後15天、30天、40天、孕穗期及齊穗期，各施用1次。		共5次					1090504	嘉農企業股份有限公司