

臺灣山芋 (*Dioscorea bulbifera* L.) 植株性狀 遺傳變異研究¹

龔財立²、林順福³

摘要

藉由臺灣山芋種原 8 個質量性狀及 9 個數量性狀調查，以評估其種原遺傳變異。調查結果，8 個質量性狀中以莖蔓顏色及芽色性狀頻度分佈較均勻，可供遺傳變異評估及品種鑑定參考，輔以 9 個數量性狀，以增加種原評估或鑑定效果。9 個數量性狀中葉長度、葉柄長度、葉長前寬比及葉長中寬比等 4 個性狀適合作為辨識種原重要指標。以群聚分析評估山芋種原植株外表性狀遺傳歧異性，結果顯示地區族群相互重疊。本研究對臺灣山芋種原植株性狀進行調查，並建立其種原蒐集、評估及利用上重要資訊。

關鍵詞：遺傳歧異性、山藥、種原收集、植株外表性狀、山芋

前言

臺灣地處亞熱帶與熱帶，由於地形因素跨熱、暖、溫與寒帶不同氣候區，地理與氣候的多樣性豐富了臺灣植物資源，重要作物野生近緣種至少有 200 種。基於本土作物遺傳資源保護的立場，對於該等原生於臺灣且在農園藝上可利用的種原，更應積極加以蒐集、保存與利用（邱和許，2007）。植物族群長時間受氣候環境因素的影響，分布廣大地區之族群，易造成種內和不同地區族群間變異，致因種內遺傳分化，而形成不同生態型（McLaughlin, 1986）。植物數量性狀，對其是否能在環境中生存，有很大的影響，常因適應某一特定環境，而形成具某些特定性狀之生態型（Rezai and Frey,

¹. 行政院農業委員會桃園區農業改良場研究報告第 479 號。

². 桃園區農業改良場副研究員兼站長。

³. 國立臺灣大學農藝學系副教授(通訊作者, shunfu@ntu.edu.tw)。

1989），例如生長於臺灣的五節芒族群（Chou *et al.*, 1987）與香附子族群（陳和曾，1990）亦發現不同地區族群有分化現象。

薯蕷屬（*Dioscorea*）為多年生蔓性植物，分類上屬於薯蕷科（Dioscoreaceae），可供食用及藥用（蕭，2001；Huber, 1998），主要用途為地下塊莖或根莖（那等，1978）。為營養體繁殖作物，部分種（species）可行有性繁殖，目前主要分布在熱帶地區，其中以中南美洲最多，次為東南亞及非洲，全世界至少有 600 個種，其中 10 個種可供食用（Lebot, 2009），中國約有 66 個種及 1 亞種（李等，1999），Liu 和 Huang (1978) 在臺灣植物誌指出薯蕷屬植物在臺灣有 14 個種及 6 個變種，Huang 和 Hsiao (2000) 在臺灣植物誌新修訂版中，修正薯蕷屬植物在臺灣有 14 個種及 4 個變種。山芋俗稱黃藥子、黃獨、山慈姑、本首烏及臺灣何首烏，主要利用部位為地下塊莖（那等，1978），為重要保健作物，同時可行有性及營養體繁殖，為臺灣野生薯蕷屬植物。

臺灣位於亞熱帶地區，氣候及土壤條件非常適合薯蕷屬植物生長（龔等，1999ab，2000ab），因此，臺灣擁有相當多的薯蕷屬植物種原（廖，2000；謝，2008；蕭，2001）。薯蕷屬植物的判別，通常藉由植物性狀的形態差異判斷，如藤蔓型態及芽葉性狀等，其優點除不需任何儀器輔助，可直接在田間辨認，為傳統鑑別依據（林等，2011；胡等，2005；賴等，2005；Anil *et al.*, 2011；Beyene, 2013；Dansi *et al.*, 1999；Hasan *et al.*, 2008；Msowoya-Mkwaila *et al.*, 2013；Mwiringi *et al.*, 2009；Wilkin *et al.*, 2002）。臺灣各地區生育環境、氣候迥異，而山芋種原分布全島，因此，瞭解臺灣不同地區山芋種原間變異，對育種及種原保存實有助益。故本研究進行臺灣山芋種原收集，並利用植株外表性狀以探討其遺傳歧異性，供未來野生種山藥種原鑑別及育種之參考。

材料與方法

一、植物材料

本研究 2010 年在臺灣北部（N）（ $24^{\circ}27'N\sim25^{\circ}10'N$, $120^{\circ}48'E\sim121^{\circ}49'E$, 12~566 m）、中部（M）（ $23^{\circ}47'N\sim24^{\circ}15'N$, $120^{\circ}37'E\sim120^{\circ}56'E$, 108~457 m）、南部（S）（ $21^{\circ}59'N\sim23^{\circ}37'N$, $120^{\circ}28'E\sim120^{\circ}49'E$, 39~506 m）及東部（E）（ $22^{\circ}03'N\sim24^{\circ}10'N$, $121^{\circ}00'E\sim121^{\circ}35'E$, 10 m~244 m）等四個地理區域進行山芋種原收集，涵蓋臺灣本島 13 個次族群，共蒐集 35 個種原，其中在北部地區包括宜蘭（Y）、臺北（P）、新竹（H）及苗栗（M）次族群有 14 個種原；中部地區包括臺中（C）、彰化（A）及南

投 (O) 次族群有 5 個種原；南部地區包括雲林 (U)、臺南 (N)、高雄 (K) 及屏東 (G) 次族群有 11 個種原；東部地區包括花蓮 (L) 及臺東 (D) 次族群有 5 個種原，採集地點之分布如表 1 及圖 1。

表 1 臺灣收集山芋種原資料表

Table 1. Geographical data for 35 germplasm of *D.bulbifera* L. collected from Taiwan in 2010

代號 Code	種原 ^z Germplasm	採集地 Location	緯度 Latitude (N)	經度 Longitude (E)	海拔高度 Altitude (m)
1	NY1	南澳 南澳 Nanao Nanao	24°28.095'	121°48.434'	28
2	NY2	南澳 金岳 Nanao Jinyue	24°27.704'	121°46.969'	41
3	NY3	南澳 東澳 Nanao Dongao	24°30.383'	121°49.953'	130
4	NY4	礁溪 林美 Jiaoxi Linmei	24°49.503'	121°44.140'	229
5	NP1	臺北 臺大 Taipei Taiwan University	25°01.020'	121°32.290'	12
6	NP2	陽明山 魚路 Yangminshan Yulu	25°10.672'	121°34.996'	384
7	NP3	陽明山 紗帽 Yangminshan shamao	25°08.581'	121°32.614'	341
8	NP4	萬里 太和 Wanli Taihe	25°10.787'	121°39.280'	187
9	NH1	北埔 南埔 Beipu Nanpu	24°41.526'	121°03.047'	168
10	NH2	五峰 花園 Wufeng Huayuan	24°39.644'	121°09.115'	540
11	NH3	五峰 清泉 Wufeng Qingquan	24°34.562'	121°06.226'	551
12	NH4	橫山 田寮 Hengshan Tainliao	24°41.277'	121°06.562'	566
13	NM1	銅鑼 雞隆 Tongluo jilong	24°28.478'	120°48.075'	135

表 1 臺灣收集山芋種原資料表（續）

Table 1. Geographical data for 35 germplasm of *D.bulbifera* L. collected from Taiwan in 2010. (continue)

代號 Code	種原 ^z Germplasm	採集地 Location	緯度 Latitude (N)	經度 Longitude (E)	海拔高度 Altitude (m)
14	NM2	三灣 大河 Sanwan Dahe	24°38.155'	120°57.377'	105
15	MC1	石岡 龍興 Shigang Longxing	24°15.863'	120°47.186'	457
16	MA1	芬園 楓坑 Fenyuan Fengkeng	24°00.835'	120°37.251'	108
17	MO1	水里 大灣 Shuili Dawan	23°47.300'	120°53.322'	333
18	MO2	國姓 北港 Guoxing Beigang	24°03.525'	120°54.340'	354
19	MO3	信義 地利 Xinyi Dili	23°47.560'	120°56.477'	374
20	SU1	古坑 山峰 Gukeng Shanfeag	23°37.818'	120°37.062'	310
21	SU2	古坑 檳湖 Gukeng Zhanghu	23°37.767'	120°38.555'	506
22	SN1	白河 仙草 Baihe Xiancao	23°20.366'	120°28.634'	200
23	SN2	白河 水火同源 Baihe Shuihuotongyuan	23°19.352'	120°29.145'	485
24	SK1	旗山 旗尾 Qishan Qiwei	22°53.076'	120°30.126'	68
25	SK2	茂林 上茂林 Maolin Shangmaolin	22°53.261'	120°40.028'	266
26	SK3	茂林 萬山 Maolin Wanshan	22°54.860'	120°41.130'	266
27	SG1	山地門 達來 Shandimen Dali	22°43.240'	120°39.694'	390
28	SG2	霧臺 伊拉 Wutai Yila	22°44.710'	120°41.030'	466

表 1 臺灣收集山芋種原資料表（續）

Table 1. Geographical data for 35 germplasm of *D.bulbifera* L. collected from Taiwan in 2010. (continue)

代號 Code	種原 ^z Germplasm	採集地 Location	緯度 Latitude (N)	經度 Longitude (E)	海拔高度 Altitude (m)
29	SG3	恆春 萬里桐 Hengchun Walitong	21°59.987'	120°42.395'	39
30	SG4	滿州 長樂 Manzhou Changle	22°03.929'	120°49.553'	124
31	ED1	蘭嶼 東清 Lanyu Dongging	22°03.013'	121°33.772'	10
32	ED2	卑南 知本 Beinan Zhiben	22°41.354'	121°00.104'	244
33	EL1	壽豐 池南 Shoufeng Chinan	23°55.324'	121°30.455'	147
34	EL2	秀林 西拉岸 Xiulin Xilaan	24°10.308'	121°35.604'	112
35	EL3	玉里 安通 Yuli Antong	23°17.042'	121°20.497'	213

z 第一順位英文代號: E=East region ; M=Central region ; N=North region ; S=South region

第二順位英文代號: A=Changhua ; C=Taichung ; D=Taitung ; G=Pingtung ; H=Hsinchu ; K=Kaohsiung ; L=Hualien ; M=Miaoli ; N=Tainan ; O=Nantou ; P=Taipei ; U=Yunlin ; Y=Yilan

阿拉伯數字: 縣市地理區內種原序號。




圖 1 臺灣種原山芋採集地點

Fig. 1. Map of collection sites for *D. bulbifera* L. in Taiwan.

二、方法

所有供試山芋種原於 2010 年 2 月至 2011 年 4 月以盆栽方式種植於本場試驗田，2012 年全生育期（幼葉顏色及芽色於生育初期調查，其餘性狀於生育後期調查）調查植株外表性狀。

(一) 植株外表性狀調查

本研究調查 8 個質量性狀及 9 個數量性狀，數量性狀依據標準偏差將各性狀分成 5 級。

1. 質量性狀調查項目：

- (1) 葉形 (leaf shape)：1 級心臟形 (cordate)，2 級箭頭形 (sagittate)，3 級戟形 (hastate)，4 級披針形 (lanceolate)。
- (2) 葉基部形 (leaf base shape)：1 級心形 (cordate)，2 級箭形 (sagittate)，3 級耳形 (auriculate)，4 級戟形 (hastate)，5 級截形 (truncate)。
- (3) 老葉顏色 (matured leaf color)：1 級濃綠 (dark green)，2 級綠 (green)，3 級淺綠 (light green)。
- (4) 幼葉顏色 (young leaf color)：1 級綠 (green)，2 級紫綠 (Purple green)，3 級紫 (purple)。
- (5) 莖蔓形狀 (stem shape)：1 級角狀 (angle)，2 級角狀帶翼 (angle with wing)，3 級圓筒狀 (cylinder)。
- (6) 莖蔓顏色 (stem color)：1 級綠 (green)，2 級紫綠 (Purple green)，3 級紫 (purple)。
- (7) 莖蔓表皮 (stem epidermis)：1 級光滑 (glossy)，2 級基部有刺狀物 (base thorn-like)，3 級全株有刺狀物 (whole plant thorn-like)。
- (8) 芽色 (bud color)：1 級綠 (green)，2 級淡紫 (light purple)，3 級紫 (purple)。

2. 數量性狀調查項目（有效位數取小數點後 2 位）：

- (1) 葉長度 (leaf length)：取最大 5 葉測量長度，以平均值分 5 級。1 級 < 5.77 cm，2 級 5.77~8.04 cm，3 級 8.05~10.32 cm，4 級 10.33~12.61 cm，5 級 > 12.61 cm。
- (2) 葉前部寬度 (terminal leaf width)：取最大 5 葉，測量前半部最大寬度，以平均值分 5 級。1 級 < 2.57 cm，2 級 2.57~4.66 cm，3 級 4.67~6.76 cm，4 級 6.77~8.87 cm，5 級 > 8.87 cm。

- (3) 葉中部寬度 (medial leaf width)：取最大 5 葉，測量中部最大寬度，以平均值分 5 級。1 級 < 1.40 cm, 2 級 1.40~3.48 cm, 3 級 3.49~5.57 cm, 4 級 5.58~7.67 cm, 5 級 > 7.67 cm。
- (4) 葉柄長度 (petiole length)：取最大 5 葉，測量葉柄長度，以平均值分 5 級。1 級 < 1.41 cm, 2 級 1.41~2.65 cm, 3 級 2.66~3.90 cm, 4 級 3.91~5.15 cm, 5 級 > 5.15 cm。
- (5) 葉柄直徑 (petiole diameter)：取最大 5 葉，測量葉柄直徑，以平均值分 5 級。1 級 < 0.83 mm, 2 級 0.83~1.12 mm, 3 級 1.13~1.42 mm, 4 級 1.43~1.72 mm, 5 級 > 1.72 mm。
- (6) 莖節間長度 (internode length)：量第 3 節位至第 8 節位之莖節間長度，以平均值分 5 級。1 級 < 5.81 cm, 2 級 5.81~7.78 cm, 3 級 7.79~9.77 cm, 4 級 9.78~11.77 cm, 5 級 > 11.77 cm。
- (7) 莖部直徑 (stem diameter)：量第 3 節位至第 8 節位之莖部直徑，以平均值分 5 級。1 級 < 1.19 mm, 2 級 1.19~1.84 mm, 3 級 1.85~2.49 mm, 4 級 2.50~3.16 mm, 5 級 > 3.16 mm。
- (8) 葉長前寬比 (ratio of leaf length and terminal width)：取最大 5 葉，以長度及前部寬度之比值平均分 5 級。1 級 < 1.14, 2 級 1.14~1.51, 3 級 1.52~1.89, 4 級 1.90~2.29, 5 級 > 2.29。
- (9) 葉長中寬比 (ratio of leaf length and medial width)：取最大 5 葉，以長度及中部寬度之比值平均分 5 級；1 級 < 1.21, 2 級 1.21~1.92, 3 級 1.93~2.64, 4 級 2.65~3.37, 5 級 > 3.37。

(二) 統計分析

1. 農藝性狀評估

利用 SPSS 軟體 Descriptives 計算種原間之各項農藝數量性狀平均值 (mean)、標準偏差 (standard deviation, SD)、變異係數 (coefficient of variation, CV)、偏態係數 (skewness) 及峰度係數 (kurtosis)。

2. 農藝性狀相關性檢定

利用 SPSS 軟體 Bivariate Correlations 針對各參試種原進行性狀間相關係數分析，並進行相關係數顯著性測驗。

3. 農藝性狀群聚分析

計算調查性狀平均值，將性狀級數化，分成 1-5 級，並以每一參試種原為運算分類單位 (operational taxonomic unit, OTU)。各種原之相似係數計算方式係先根據性狀相同級數之出現與無出現（出現以 1，無出現以 0 表示）記錄之，再依 Jaccard (1908) 之定義計算其 Jaccard 相似度。公式： $J=a/(a+b+c)$ ， a : 表示 OTU_i 與 OTU_j ($i \neq j$ ； $i,j=1,2,\dots,N$ ；其中 N 為參試品系數) 同時擁有之相同性狀級數數目； b : 表示 OTU_i 擁有，而 OTU_j 缺少之相同性狀級數數目； c : 表示 OTU_i 缺少，而 OTU_j 擁有之相同性狀級數數目。再根據計算出之相似係數矩陣，利用 NT-SYSpcl2.1 軟體，以 UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic mean) 方法進行群聚分析 (cluster analysis)，以求出參試種原間之差異 (Rohlf, 1997)。群聚分析依種原間之遺傳相似性，繪出樹狀分枝圖，以探討種原間遺傳變異及親緣關係。

結 果

一、植株性狀調查

(一) 質量性狀調查

葉形、葉基部形、老葉顏色、幼葉顏色、莖蔓形狀、莖蔓顏色、莖蔓表皮及芽色等 8 個質量性狀調查結果如表 2 所示，35 個種原中葉形均為心臟形 (100%) (圖 2)；葉基部形全為心形 (100%)；老葉顏色以濃綠色 (51%) 為主，其餘為淺綠色 (43%) 及綠色 (6%)；幼葉顏色以紫綠色 (51%) 為主，其餘為綠色 (49%)；莖蔓形狀全為圓筒狀 (100%)；莖蔓顏色多為紫色 (49%)，其餘為紫綠色 (29%) 及綠色 (22%)；莖蔓表皮全為光滑 (100%)；芽色多為紫色 (49%)，其餘為淡紫色 (29%) 及綠色 (22%)。由植株性狀觀察，8 個質量性狀除莖蔓顏色及芽色性狀分佈較均勻外，其餘 6 個性狀均偏向於特定外表型。該等性狀特性可供山芋種原初步或快速鑑別參考。

表 2 山芋種原植株質量性狀表

Table 2. Qualitative traits for the germplasm of *D. bulbifera* L.

編號 Code	種原 Germplasm	葉形 Leaf shape	葉基部形 Leaf base shape	老葉顏色 Matured leaf color	幼葉顏色 Young leaf color	莖蔓形狀 Stem shape	莖蔓顏色 Stem color	莖蔓表皮 Stem epidermis	芽色 Bud color
1	NP1	心臟形	心形	濃綠	紫綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
2	MC1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
3	SN1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
4	SK1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
5	SK2	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
6	SG1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
7	SG2	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
8	NP2	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
9	NP3	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
10	NM1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
11	NP4	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
12	ED1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
13	NH1	心臟形	心形	綠	綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
14	NM2	心臟形	心形	綠	綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
15	MA1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
16	NY1	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
17	NY2	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
18	EL1	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
19	SU1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
20	SU2	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
21	MO1	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
22	NH2	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
23	SN2	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
24	SK3	心臟形	心形	淺綠	紫綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
25	NY3	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
26	MO2	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
27	MO3	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫

表 2 山芋種原植株質量性狀表 (續)

Table 2. Qualitative traits for the germplasm of *D. bulbifera* L. (continue)

編號 Code	種原 Germplasm	葉形 Leaf shape	葉基部形 Leaf base shape	老葉顏色 Matured leaf color	幼葉顏色 Young leaf color	莖蔓形狀 Stem shape	莖蔓顏色 Stem color	莖蔓表皮 Stem epidermis	芽色 Bud color
28	ED2	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
29	NH3	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
30	SG3	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
31	SG4	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
32	NH4	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫綠	光滑	淡紫
33	NY4	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	綠	光滑	綠
34	EL2	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫
35	EL3	心臟形	心形	濃綠	綠	圓筒狀	紫	光滑	紫




圖 2 山芋種原葉部形態

Fig. 2. Leaf shapes for the germplasm of *D. bulbifera* L.

(二) 數量性狀調查

葉長度、葉前部寬度、葉中部寬度、葉柄長度、莖節間長度、葉柄直徑、莖部直徑、葉長前寬比及葉長中寬比等 9 個數量性狀調查結果如表 3 及圖 3 所示。葉長度平均 9.19 cm，標準差 2.28，偏態係數-0.133 及峰度係數-0.360，顯示葉長度性狀為略左偏分佈，且分佈較為分散。葉前部寬度平均 5.72 cm，標準差 2.10，偏態係數 0.510 及峰度係數-0.404。葉中部寬度平均 4.53 cm，標準差 2.09，偏態係數 0.916 及峰度係數 0.180；葉柄長度平均 3.28 cm，標準差 1.25，偏態係數 1.048 及峰度係數 0.803。莖節間長度平均 8.79 cm，標準差 1.99，偏態係數 0.428 及峰度係數-0.142。葉柄直徑平均 1.28 mm，標準差 0.30，偏態係數 0.641 及峰度係數-0.157。莖部直徑平均 2.17 mm，標準差 0.65，偏態係數 0.321 及峰度係數-0.705。葉長前寬比平均 1.71，標準差 0.38，偏態係數 0.090 及峰度係數 0.160。葉長中寬比平均 2.29，標準差 0.72，偏態係數 0.556 及峰度係數 0.424。以上顯示葉前部寬度、葉中部寬度、葉柄長度、莖節間長度、葉柄直徑、莖部直徑、葉長前寬比及葉長中寬比等 8 個數量性狀均為右偏分佈，分佈較分散，其中以葉長前寬比性狀最接近對稱分佈。

9 個數量性狀葉中部寬度的變異係數 (CV) 最高 46%，其次葉柄長度及葉前部寬度分別為 38% 及 37%，顯示該 3 個性狀相對變異程度高，也表示相對於其他性狀此 3 性狀於種原間變異性較大；而葉長前寬比、莖節間長度及葉柄直徑的變異係數較低，分別為 22%、23% 及 23%，則顯示其變異程度相對較小。




圖 3 山芋種原植株數量性狀分布

Fig. 3. The frequency distribution of quantitative traits for the germplasm of *D. bulbifera* L.

表 3 山芋種原植株數量性狀統計值

Table 3. The statistic values of quantitative traits for the germplasm of *D. bulbifera* L.

性狀 Traits	個數 Number	平均值 Mean	標準偏差 Standard deviation	變異係數 Coefficient of variation (%)	偏態係數 Skewness	峰度係數 Kurtosis
葉長度 Leaf length	35	9.19	2.28	25	-0.133	-0.360
葉前部寬度 Terminal leaf width	35	5.72	2.10	37	0.510	-0.404
葉中部寬度 Medial leaf width	35	4.53	2.10	46	0.916	0.180
葉柄長度 Petiole length	35	3.28	1.25	38	1.048	0.803
莖節間長度 Internode length	35	8.79	1.99	23	0.428	-0.142
葉柄直徑 Petiole diameter	35	1.28	0.30	23	0.641	-0.157
莖部直徑 Stem diameter	35	2.17	0.65	30	0.321	-0.705
葉長前寬比 Leaf length/terminal width	35	1.71	0.38	22	0.090	0.160
葉長中寬比 Leaf length/medial width	35	2.29	0.72	31	0.556	0.424

二、山芋種原植株性狀相關性檢定

9 個數量性狀以 Pearson correlation 進行相關性檢定（表 4）。顯示葉長度與葉前部寬度、葉中部寬度、葉柄長度、葉柄直徑及莖直徑達極顯著正相關，與節間長度達顯著正相關，與葉長前寬比達顯著負相關；葉前部寬度與葉中部寬度、葉柄長度、節間長度、葉柄直徑及莖直徑達極顯著正相關，與葉長前寬比及葉長中寬比達極顯著負相關；葉中部寬度與葉柄長度、節間長度、葉柄直徑及莖直徑達極顯著正相關，與葉長前寬比及葉長中寬比達極顯著負相關；葉柄長度與節間長度、葉柄直徑及莖直徑達極顯著正相關，與葉長前寬比及葉長中寬比達顯著負相關；節間長度與葉柄直徑達顯

著正相關，與葉長前寬比及葉長中寬比達顯著負相關；葉柄直徑與莖直徑達極顯著正相關，與葉長前寬比及葉長中寬比達極顯著負相關；莖直徑與葉長前寬比及葉長中寬比達顯著負相關；葉長前寬比與葉長中寬比達極顯著正相關。此說明部份山芋的植株性狀為彼此相關，故在有限人力資源下調查兩個相關性狀時，可考慮優先調查遺傳變異性大且易於評量之性狀。

表 4 山芋種原植株數量性狀相關係數

Table 4. The correlation coefficients between quantitative traits for the germplasm of *D. bulbifera* L.

性狀 Traits	葉長度 LL	葉前部 寬度 TLW	葉中部 寬度 MLW	葉柄 長度 PL	莖節間 長度 IL	葉柄 直徑 PD	莖部 直徑 SD	葉長前 寬比 LLTW
葉前部寬度 TLW	0.76**							
葉中部寬度 MLW	0.65**	0.93**						
葉柄長度 PL	0.60**	0.79**	0.78**					
莖節間長度 IL	0.42*	0.47**	0.45**	0.47**				
葉柄直徑 PD	0.54**	0.78**	0.86**	0.75**	0.35*			
莖部直徑 SD	0.52**	0.68**	0.68**	0.72**	0.23	0.72**		
葉長前寬 LLTW	-0.181*	-0.73**	-0.69**	-0.48*	-0.38*	-0.53**	-0.39*	
葉長中寬比 LLMW	-0.183	-0.64**	-0.78**	-0.46*	-0.35*	-0.63**	-0.41*	0.83**

^z: *及**分別代表 5% 及 1% 之顯著水準。

LL: 葉長度； TLW: 葉前部寬度； MLW: 葉中部寬度； PL: 葉柄長度； IL: 莖節間長度； PD: 葉柄直徑； SD: 莖部直徑； LLTW: 莖部直徑； LLMW: 葉長中寬比。

^z: *and** at the 5% and 1% probability level, respectively.

LL: leaf length ; TLW:terminal leaf width ; MLW:medial leaf width ; PL:petiole length ; IL:internode length ; PD:petiole diameter ; SD:stem diameter ; LLTW:leaf length / terminal width ; LLMW:leaf length/ medial width

三、山芋種原植株性狀遺傳相似性分析

山芋種原 17 個植株性狀以 Jaccard 係數運算 (Jaccard, 1908)，得到各種原間的遺傳相似性 (similarity) 介於 13.3%~78.9% 之間 (即遺傳距離介於 21.1%~86.7% 之間)，所有種原的平均遺傳相似性 34.3%，以中部地區 35.9% 最高，其餘北、南及東部地區分別為 33.3、34.7 及 34.7% (表 5)。根據植株性狀遺傳相似性分析結果，編號 NH1 (北埔 南埔) 及 NM2 (三灣 大河)、MO1 (水里 大灣) 及 SK1 (旗山 旗尾)、NH3 (五峰 清泉) 及 MO1 (水里 大灣) 等 3 對種原遺傳相似度 78.9% 最高，其次為編號 NP3 (陽明山 紗帽) 及 NH3 (五峰 清泉)，編號 MO1 (水里 大灣) 及 SK2 (茂林 上茂林)，編號 MO2 (國姓 北港) 及 ED2 (卑南 知本)，編號 NP3 (陽明山 紗帽) 及 MO3 (信義 地利)，編號 SK1 (旗山 旗尾) 及 SK2 (茂林 上茂林) 等 5 對種原，其遺傳相似度皆為 70.0%，種原間遺傳相似度最低達 13.3%，顯然山芋部分種原植株外表性狀已有高度變異。

表 5 臺灣山芋 4 個地理區種原遺傳相似性表

Table 5. The genetic similarity of four geographic regions for the germplasm of *D. bulbifera* L. in Taiwan.

地理區 Region	種原個數 No. of germplasms	平均相似性 Average similarity (%)	最低相似性 Minimum similarity (%)	最高相似性 Maximum similarity (%)
北部地區 North	14	33.3	13.3	78.9
中部地區 Central	5	35.9	13.3	78.9
南部地區 South	11	34.7	13.3	78.9
東部地區 East	5	34.7	13.3	70.0
全部地區 All	35	34.3	13.3	78.9

四、山芋種原植株性狀群聚分析

以 UPGMA 方法進行群聚分析，繪製親緣關係樹狀圖（圖 4）。以相似性 0.332 作為分群依據，將所有種原區分成 4 大群（表 6）；若依據相似性 0.388，第Ⅱ大群可分成 b1、b2、b3 及 b4 等 4 小群，第Ⅳ大群可分成 d1、d2 及 d3 等 3 小群，而其中以 d2 小群 10 個種原最多。

第Ⅰ大群為編號 NH1（北埔 南埔）、NM2（三灣 大河）、MC1（石岡 龍興）、SG1（山地門 達來）及 ED1（蘭嶼 東清）等 5 個種原。第Ⅱ大群分成 4 小群，b1 小群有編號 MO1（水里 大灣）、SN2（白河 水火同源）、SK1（旗山 旗尾）、SK2（茂林 上茂林）及 SG2（霧臺 伊拉）等 5 個種原，b2 小群有編號 NP4（萬里 太和）、NM1（銅鑼 雞隆）及 SU2（古坑 樟湖）等 3 個種原，b3 小群有編號 MA1（芬園 楓坑）及 SN1（白河 仙草）等 2 個種原，b4 小群有編號 NP1（臺北 臺大）、SU1（古坑 山峰）及 SK3（茂林 萬山）等 3 個種原。第Ⅲ大群只有編號 NH4（橫山 田寮）1 個種原，第Ⅳ大群分成 3 小群，d1 只有編號 NH2（五峰花園），d2 有編號 NY3（南澳 東澳）、NP3（陽明山 紗帽）、NH3（五峰 清泉）、MO2（國姓 北港）、MO3（信義 地利）、SG3（恆春 萬里桐）、SG4（滿州 長樂）、ED2（卑南 知本）、EL2（秀林 西拉岸）及 EL3（玉里 安通）等 10 個種原；d3 有 NY1（南澳 南澳）、NY2（南澳 金岳）、NY4（礁溪 林美）、NP2（陽明山 魚路）及 EL1（壽豐 池南）等 5 個種原。第Ⅰ及Ⅳ大群之種原來自臺灣全島族群，第Ⅱ大群包含北部、中部及南部地區族群，第Ⅲ大群則為臺灣北部地區族群。

表 6 山芋種原植株性狀群聚分析分群表

Table 6. The classification of cluster analysis based on traits for the germplasm of *D. bulbifera* L.

大群 Classification	地理區 ^z Region	小群 Subgroup	種原 Germplasm
I	N、M、S、E	a	NH1、NM2、MC1、SG1、ED1
II	M、S	b1	MO1、SN2、SK1、SK2、SG2
	N、S	b2	NP4、NM1、SU2
	M、S	b3	MA1、SN1
	N、S	b4	NP1、SU1、SK3
III	N	c	NH4
IV	N	d1	NH2
	N、M、S、E	d2	NY3、NP3、NH3、MO2、MO3、SG3、 SG4、ED2、EL2、EL3
	N、E	d3	NY1、NY2、NY4、NP2、EL1

^z N: North, M: Central, S: South, E: East




圖 4 山芋種原植株性狀群聚分析圖

Fig. 4. The UPGMA dendrogram of the genetic similarity based on traits for the germplasm of *D. bulbifera* L.

討 論

一、植株性狀調查

山芋種原 8 個質量性狀調查結果顯示，在 35 個種原中，葉形為心臟形佔 100%，葉基部形為心臟形佔 100%，僅葉長度及葉寬度具有差別，可見山芋為臺灣薯蕷薯植物中葉形變化較簡單的物種；莖蔓顏色則具有相當程度的變化，一般多為綠色，本研究中多為紫色 (49%)，其次為紫綠色 (29%) 及綠色 (22%)，莖蔓顏色特性亦為綠色中或多或少帶有深淺程度不一之紫色細斑，可做為種原間判別依據；芽色多為紫色 (49%)，其次為淡紫色 (29%) 及綠色 (22%)，通常芽色與莖蔓顏色密切相關，紫色莖蔓之芽色其帶紫色程度較高。8 個質量性狀除莖蔓顏色及芽色性狀分佈較均勻外，其餘 6 個性狀均偏向於特定外表型，該等植株質量性狀特性可供山芋種原初步或快速鑑別參考。

葉長度、葉前部寬度、葉中部寬度、葉柄長度、莖節間長度、葉柄直徑、莖部直徑、葉長前寬比及葉長中寬比等 9 個數量性狀調查結果，經 SPSS 軟體計算偏態係數及峰度係數後，依偏態係數定義係用以指出一個分佈以其平均值為中心的不對稱程度，當等於 0 時為對稱分佈，大於 0 時為右偏分佈，即分佈集中於低數值方面，小於 0 時為左偏分佈，即分佈集中於高數值方面，分析結果偏態係數除葉長度外皆大於 0，葉長度為左偏分佈，其餘性狀為右偏分佈，其中以葉長前寬比 0.090 最接近對稱分佈。峰度係數分析結果皆小於 3，均為低闊峰，分佈較為平坦分散，其中以葉柄長度 (0.803) 最接近常態峰分佈。

9 個數量性狀中葉中部寬度的變異係數 (CV) 高達 46%，其次葉柄長度及葉前部寬度分別為 38% 及 37%，顯示前 3 者相對變異程度高，也表示相對於其他性狀葉中部寬度、葉柄長度及葉前部寬度於種原間變異性較大，適合作為山芋種原間鑑別指標；葉長前寬比、莖節間長度及葉柄直徑的變異係數分別為 22%、23% 及 23% 較低，顯示其變異程度較小，較不適合作為山芋種原間鑑別依據。

二、植株性狀相關性檢定

山芋種原 9 個數量性狀相關性檢定結果，葉長度與葉前部寬度、葉中部寬度、葉柄長度、葉柄直徑及莖直徑達極顯著正相關，葉前部寬度與葉中部寬度、葉柄長度、

節間長度、葉柄直徑及莖直徑達極顯著正相關，葉柄長度與節間長度、葉柄直徑及莖直徑也達極顯著正相關。

以上顯示部份山芋種原植株性狀為彼此相關，故在有限人力資源下調查兩個相關性狀時，可考慮優先調查遺傳變異性大，且易於評量之性狀為宜，建議優先調查葉中部寬度、葉柄長度及葉前部寬度等 3 個性狀。

三、植株性狀遺傳相似性分析

利用 17 個植株性狀調查資料，經過 Jaccard 係數運算 (Jaccard, 1908)，得到各種原間的遺傳相似性，介於 13.3%~78.9% 之間；平均遺傳相似性低於 50%，僅 34.3%，顯然山芋種原間植株外表性狀遺傳歧異度高，Norman 等 (2011) 針對收集自非洲獅子山共和國境內的大薯 (*D. alata*)、非洲山藥 (*D. rotundata*) 及山芋 (*D. bulifera*) 等 3 個物種（共 52 個種原），調查 28 個植株外表性狀，並進行遺傳變異分析，結果顯示不同物種種原間具有高度植株外表性狀多型性，推測其遺傳歧異性主要來自有性生殖遺傳物質的互換，或部分來自營養體細胞突變，此與本研究植株外表性狀遺傳歧異度高之情況類似，山芋物種於野外均可行有性生殖，因而造就植株外表性狀之高遺傳歧異度。

根據植株性狀遺傳相似性結果，山芋種原編號 NH1 (北埔 南埔) 及 NM2 (三灣 大河)、MO1 (水里 大灣) 及 SK1 (旗山 旗尾)、NH3 (五峰 清泉) 及 MO1 (水里 大灣) 等 3 對種原之遺傳相似度 78.9% 最高，3 對種原皆採集於灌木林中，其生長環境類似，而相同材料進行 ISSR 分子標誌遺傳相似性分析結果分別為 43.9%、50.0% 及 41.0% (龔，2015)，其種原間遺傳相似性介於 28.6%~77.8% 之間，顯示其生育環境比基因型影響植株外表性狀更大。

四、植株性狀群聚分析

山芋種原群聚分析結果，將所有種原區分成 4 大群，第 I 大群有 5 個種原，第 II 大群 13 個種原。第 III 大群僅編號 H4 (橫山 田寮) 1 個種原，第 IV 大群 16 個種原；第 I 及 IV 大群為涵蓋臺灣全島族群，第 II 大群為北、中及南部地區族群，第 III 大群為北部地區族群，依植株外表性狀可看出臺灣全島的山芋種原並未受地理隔離，不同地區種原相互重疊。

參考文獻

- 李鵠鳴、張曉蓉、王菊鳳。1999。我國薯蕷屬植物基礎研究進展。經濟林研究 17(2):43-48。
- 那琦、甘偉松、楊榮季。1978。臺灣產藥材之生藥學研究(IV)臺灣產零餘子生藥學研究。中國醫藥學院研究年報 9:330-375。
- 邱輝龍、許坤塗。2007。作物野生近緣種的保存與利用。林業研究專訊 14(4):2-5。
- 林尚誼、邱垂豐、胡智益、林順福。2011。臺灣油茶種原葉部性狀變異之評估。臺灣農學會報 12(6):513-532。
- 胡智益、郭冠黎、蔡右任、林順福。2005。臺灣茶樹種原葉部性狀之調查及遺傳變異分析。臺灣茶業研究彙報 24:1-20。
- 陳勝彰、曾富生。1990。臺灣旱田雜草香附子種內變異之研究Ⅱ.七個地區族群之形態特性之變異。中華民國雜草學會會刊 11:45-61。
- 廖俊奎。2000。臺灣產薯蕷屬(薯蕷科)之分類研究(A Taxonomic Study on *Dioscorea* L. (Dioscoreaceae) of Taiwan)。國立中山大學生物科學系碩士班碩士論文。臺灣。高雄。
- 賴瑞聲、高瑞隆、林義恭、胡敏夫、劉新裕。2005。山藥種原外表形態及分子標記之變異研究。臺灣農業研究 54:195-206。
- 蕭錦隆。2001。臺灣產薯蕷屬植物之分類研究。國立臺灣大學植物學研究所碩士論文。臺灣。臺北。
- 謝寰羽。2008。臺灣產薯蕷屬(薯蕷科)數值分類研究。國立屏東科技大學森林系碩士論文。臺灣。屏東。
- 龔財立、吳詩都、曾富生。1999a。臺灣野生種山藥 *Dioscorea pseudojaponica* Hayata 及 *D. doryphora* Hance 植株性狀之變異。桃園區農業改良場研究報告 37:1-13。
- 龔財立、吳詩都、曾富生。1999b。臺灣栽培種山藥田薯(*Dioscorea alata* L.)及懷山藥 (*D. batatas* Decne)植株性狀之變異。桃園區農業改良場研究彙報 39:18-27。
- 龔財立、吳詩都、曾富生。2000a。臺灣栽培種山藥田薯(*Dioscorea alata* L.)及懷山藥 (*D. batatas* Decne)種內 DNA 多型性之變異。農林學報 49(1):1-13。
- 龔財立、吳詩都、曾富生。2000b。臺灣野生種基隆野山藥及戟葉山藥種內 DNA 多型性之變異。中華農學會報 1(6):599-612。
- 龔財立。2015。臺灣薯蕷屬植物遺傳變異之研究。國立臺灣大學農藝學系博士論文。

臺灣。臺北。

- Anil, S.R., E.A.Siril, and S.S. Beevy 2011. Morphological variability in 17 wild elephant foot yam (*Amorphophallus paeoniifolius*) collections from southwest India. *Genetic Resources and Crop Evolution* 58:1263-1274.
- Beyene, T.M. 2013. Genetic diversity of aerial yam (*Dioscorea bulbifera* L.) germplasms in Ethiopia based on agronomic traits. *Agriculture, Forestry and Fisheries* 2(2): 67-71.
- Chou, C.H., S.Y. Hwang, and F.C. Chang 1987. Population study of *Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *Botanic Bulletin Academia Sinica* 28:247-281.
- Dansi, A., H.D. Mignouna, J. Zoundjihekpon, A. Sangare, R. Asiedu, and F.M. Quin 1999. Morphological diversity, cultivar groups and possible descent in the cultivated yams (*Dioscorea cayenensis/D. rotundata*) complex in Benin republic. *Genetic Resources and Crop Evolution* 46:371-388.
- Hasan, S.M.Z., A.A. Ngadin, R.M. Shah, and N. Mohamad 2008. Morphological variability of greater yam (*Dioscorea alata* L.) in Malaysia. *Plant Genetic Resources* 6(1):52-61.
- Huang, T.C. and J.L. Hsiao 2000. Dioscoreaceae. In: Huang *et al.* (ed.). *Flora of Taiwan*, 2nd ed. Vol. 5. Department of Botany, National Taiwan University, Taipei. pp. 87-98.
- Huber, H. 1998. Dioscoreaceae. In: K. Kubitzki (ed.). *The Families and Genera of Vascular plants*, Vol. III. Springer-Verlag, Berlin Germany, p.216-235.
- Jaccard, P. 1908. Nouvelles recherches sur la distribution firale. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* 44:223-270.
- Lebot, V. 2009. Tropical root and tuber crops: cassava, sweet potato, yams and aroids. In *Crop Production Science in Horticulture* vol. 17. Wallingford, UK: CAB Books, CABI, p.183-188.
- Liu, T. S. and T. C. Huang. 1978. Dioscoreaceae. pp. 99-109. In: Li *et al.* (ed.). *Flora of Taiwan*. Vol. V. Epoch Publishing Cooperation, Taiwan.
- McLaughlin, S.P. 1986. Differentiation among populations of tetraploid *Grindelia camporum*. *American Journal of Botany* 73:1748-1754.
- Msowoya-Mkwaila, W., W.J. Changadeya, and A.J.D. Ambali 2013. Morphological characterization of cultivated and wild yam (*Dioscorea spp*) in Malawi. *International Journal of Physical and Social Sciences* 3(10):295-312.

- Mwiringi, P.N., E.M. Kahangi, A.B. Ngende, and E.G. Mamati 2009. Morphological variability within the Kenyan yam (*Dioscorea* spp.). *Journal of Applied Biosciences* 16:894-901.
- Norman, P.E., P. Tongona, and P.E. Shanahan 2011. Diversity of the morphological traits of yam (*Dioscorea* spp.) genotypes from Sierra Leone. *Journal of Applied Biosciences* 45:3045-3058.
- Rezai, A. and K.J. Frey 1989. Variation for physiological and morphological traits in relation to geographic distribution of wild oats. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics* 21:1-10.
- Rohlf, F.J. 1997. NT-SYSp. *Applied Biostatistics Inc.* New York.
- Wilkin, P., K.K. Davis, P. Schols, and C.A. Furness 2002. *Dioscorea ridleyi* Prain & Burkhill and *D. palawana* Prain & Burkhill: new systematic data on two rare South-East Asian yam species. *Kew Bulletin* 57:885-900.

Genetic Variation of Morphological Characteristics for *Dioscorea bulbifera* L. in Taiwan¹

Tsai-Li Kung² and Shun-Fu Lin³

Abstract

By eight qualitative and nine quantitative traits investigated to assess its genetic variation of *D. bulbifera* L. in Taiwan. According to the distribution frequency, the qualitative traits of stem color and bud color were in uniform. These traits are suitable for the assessment of genetic variation and species identification. The quantitative traits of leaf length, petiole length, the ratio of leaf length and terminal width, the ratio of leaf length and medial width, could be used as important indicators for species identification. Based on plant traits, the cluster analysis showed the overlapping distribution in regions for *D. bulbifera* L. In this paper, studies of *D. bulbifera* L. in Taiwan have been established, and such important information will be useful in germplasm collection, evaluation and application.

Key words: genetic diversity, yam, germplasm collection, morphological characteristic, *D. bulbifera* L.

¹. Contribution No.479 from Taoyuan DARES, COA.

². Associate Researcher and Chief of Sinpu Branch Station, Taoyuan DARES, COA.

³. Associate Professor (Corresponding author, shunfu@ntu.edu.tw). Department of agronomy, NTU.